Disociación celular

Gama DD

Solución de tripsina sin calcio y sin magnesio

Ref.	Descripción	Rojo de fenol	Vol. (ml)	€
L0909-100	Tripsina 0.25 % en PBS	√	100	NC -
L0910-100	Tripsina 0.25 % en PBS		100	NC -
L0930-100	Tripsina-EDTA 1X en PBS	√	100	NC -
L0930-500	Tripsina-EDTA 1X en PBS	√	500	NC -
L0931-100	Tripsina 0,25% - EDTA en HBSS	√	100	NC -
L0932-100	Tripsina 0.25% - EDTA 0.02 % en HBSS	√	100	NC -
X0915-100	Tripsina 2.5 % en PBS		100	NC -
L0940-100	Tripsina-EDTA 1X en PBS		100	NC -
X0930-100	Tripsina -EDTA 10X		100	NC -
X0920-100	Tripsina 2.5 % en HBSS		100	NC -

Tripsina - polvo

Ref.	Descripción	Peso	€
P5957-100GR	Tripsina 1:250 en polvo (porcino)	100 g	NC -

Astucia

Todas nuestras tripsinas están disponibles también en 500 ml

Versene

Ref.	Descripción	€
L0630-100	Versene - 100 ml	NC -

Accutasa

- Alternativa a la tripsina
- Para la separación y la disociación de las células adherentes, sin componente de mamífero

Ref.	Volumen	T° de almacenamiento	€
L0950-100	100 ml	-20 °C	NC -

Gama HYCLONE

Tripsina sin calcio, sin magnesio, en HBSS

Ref.	Descripción	Vol. (ml)	€
SH30042.01	Tripsina, 0,25 % 1X con 0.2 g/l EDTA	100	NC -
SH30042.02	Tripsina, 0,25 % 1X con 0.2 g/l EDTA	500	NC -
SH30236.01	Tripsina, 0,05 % 1X con 0.2 g/l EDTA	100	NC -
SH30236.02	Tripsina, 0,05% 1X con 0,2 g/l de EDTA,	500	NC -
SV30031.01	Tripsina 0,25 % 1X Solución, con 0.1 % EDTA	100	NC -
SV30037.01	Tripsina 2,5 % 10X Solución, sin EDTA, sin rojo de fenol	100	NC -

Gama PAN BIOTECH

Tripsina

Ref.	Descripción	Rojo de fenol	Vol.	€
P10-021100	Tripsina (1 x) 0,25% PBS	-	100 ml	NC -
P10-022100	Tripsina 2,5% (10 x) PBS	-	100 ml	NC -
P10-020100	Tripsina 0,25% EDTA 0,02% PBS	-	100 ml	NC -
P10-019100	Tripsina 0,25% EDTA 0,02% PBS	√	100 ml	NC -
P10-023100	Tripsina 0,05% EDTA 0,02%PBS	-	100 ml	NC -
P10-023100SP	Tripsina 0,05% EDTA 0,02%PBS	√	100 ml	NC -
P10-024100	Tripsina 0,5% EDTA 0,2% PBS	-	100 ml	NC -
P10-027100	Tripsina 0,05 % EDTA (10 x) 0,1 % PBS	-	100 ml	NC -
P10-028100	Tripsina / EDTA PBS 0,25% tripsina 1 mM EDTA 4 Na	-	100 ml	NC -
P10-040100	Tripsina 0,05 % EDTA 0,02 % x 4 Na, HBSS	√	100 ml	NC -
En polvo				
P10-025100P	Tripsina en polvo (origen porcino) 1:250		100 g	NC -
P10-041500	Polvo de tripsina Rec. Hum. EDTA 0,2 %		500 g	NC -

Ref.	Descripción	Vol.	€
LS0002100	Dispase purificada proteasas neutras	10 mg	NC -
P10-033100	Inhibidor de tripsina 1 mg/ml	100 ml	NC -

EDTA 1 % en PBS

- Sin calcio, sin magnesio y sin rojo de fenol

Ref.	Volumen	€
P10-026100	100 ml	NC -

Accutasa

- Listo para usar
- Solución suave para el desprendimiento celular
- Sin neutralización
- Composición : enzimas de acutasa (actividad › 500 U/ml) en DPBS sin Ca/Mg con 0,5 mM EDTA y rojo de fenol

Aplicaciones Accutasa

+ Para receptores de membrana y/o citometría
+ Para las células que tienen dificultades para crecer o para volver a cultivar las células sensibles
+ Evita las pérdidas y los daños causados por la tripsinación

Ref.	Volumen	€
P10-21100	100 ml	NC -

Accumax



- Listo para usar, más concentrado
- Sustitución de tripsina

Aplicaciones:

+ Disociación de esferoides para obtener una suspensión celular a partir de agregados para un conteo celular preciso
+ Agente antiaglutinante para cultivo celular
+ Citometría de flujo
+ Clasificación de células activadas por fluorescencia (FACs)
+ Composición : Enzimas de acutasa (actividad › 1200-2000 U/ml) en DPBS sin Ca/Mg con 0,5 mM EDTA

Ref.	Volumen	€
P10-21200	100 ml	NC -
P10-21250	500 ml	NC -