Gama Himedia (continuación)

Gelificantes en polvo

Descripción	CleriGar™	CleriGel™ Ultra	CleriGel™ Super
Ref.	490656	490657	490658
Apariencia	Polvo fluido homogéneo de color blanco a blanquecino		
Solubilidad	De transparente a ligeramente turbio a 0,5 g en 100 ml de agua tras la ebullición	De transparente a ligeramente turbio a 0,2 g en 100 ml de agua tras la ebullición	De transparente a ligeramente turbio a 0,2 g en 100 ml de agua tras la ebullición
Claridad	Gel transprarente formado al enfriarse		
Pérdida por secado	≤ 20%	≤ 15%	≤ 15%
Transmisión	-	≥ 80%	≥ 80%
Poder gelificante	-	500 - 700 g/cm2	400 - 700 g/cm2
Uso	3 - 5 g/l	2 - 2,5 g/l	1,8 - 2,5 g/l

Ref.	Descripción	Vol. (g)	€
490654	Agar en polvo	500	NC -
490655	Carragenina	500	NC -
490656	CleriGar	500	NC -
490657	CleriGel Ultra	100	NC -
490658	CleriGel Super	100	NC -

Reguladores del crecimiento

Promueve la división celular, el crecimiento celular, la floración, la fructificación y la formación de semillas.

Auxinas

La auxina promueve el crecimiento de las raíces.

Ref.	Descripción	Vol.	€
490660	Ácido indol-3-acético (IAA)	5 mg	NC -
490661	Ácido indol-3-butírico (IBA)	5 g	NC -
490662	Ácido acético A-naftaleno (NAA)	25 g	NC -

Citoquininas

Estimula el crecimiento de los brotes.

Ref.	Descripción	Vol.	€
490663	Sulfato de adenina	10 g	NC -
490664	6-Benciladenina (6-BAP)	1 g	NC -
490665	N6-(2-Isopentenil) Adenina	1 g	NC -
490666	Kinetina	1 g	NC -
490667	Tidiazurón (TDZ)	1 g	NC -
490668	Meta-Topoline	25 mg	NC -
490669	Zeatina	50 mg	NC -

Giberelinas

Regulan varios procesos de desarrollo, como la elongación del tallo, la germinación, la latencia, la floración, el desarrollo de las flores y la senescencia de las hojas y los frutos.

Ref.	Descripción	Vol.	€
490670	Ácido giberélico (GA3)	1 g	NC -

Otros

Ref.	Descripción	Vol.	€
490671	Ácido abscísico : Inhibidor del crecimiento	100 mg	NC -
490672	Hidrazida maleica	100 g	NC -
490673	Floroglucinol	25 g	NC -
490674	Picloram	5 g	NC -
490675	Dihidrocloruro de putrescina	1 g	NC -
490676	Espermidina	1 g	NC -
490677	Ácido 2,4,5 triclorofenoxiacético	25 g	NC -

Antibióticos - Antimicrobianos

Antibióticos antifúngicos

Ref.	Descripción	Vol.	€
490678	Amoxicilina	10 g	NC -
490682	Amoxicilina/ácido clavulánico (Augmentin)	2 g	NC -
490680	Anfotericina B	10 g	NC -
490681	Carbendazim	5 g	NC -
490679	Carbenicilina disódica	10 g	NC -
490683	Sulfato de colistina	1 g	NC -
490684	Kanamicina (sulfato ácido)	25 g	NC -
490686	Nitrato de miconazol	25 g	NC -
490688	Ribavirin	10 mg	NC -
490687	Rifampicina	25 g	NC -
490689	Sulfato de estreptomicina	100 g	NC -
490685	Timentin	2 g	NC -

Suplemento antimicrobiano - desinfectante

Ref.	Descripción	Vol.	€
490690	Suplemento antimicrobiano	50 ml	NC -
490692	Peróxido de hidrógeno	100 ml	NC -
490693	Nitrato de plata	10 g	NC -
490694	Tween 20®	500 ml	NC -

Astucia

Otros antibióticos previa solicitud

Elementos químicos

Aminoácidos

La glicina sirve como fuente de aminoácidos
Para otros aminoácidos, contacte con nosotros.

Ref.	Descripción	Vol.	€
490695	Glicina	500 g	NC -

Tampones

Ref.	Descripción	Vol.	€
490696	Tampón MES	25 g	NC -

Enzimas

Los protoplastos son células vegetales esféricas desnudas producidas por la eliminación de la pared celular mediante enzimas digestivas.
Los protoplastos vegetales pueden cultivarse en medios definidos y formarán una nueva pared celular, se dividirán y, en muchos casos, se regenerarán en plantas completas.

El método enzimático es una técnica muy utilizada para el aislamiento de protoplastos. Las ventajas del método enzimático incluyen un buen rendimiento de células viables y un daño mínimo o nulo a los protoplastos.

Ref.	Descripción	Vol.	€
490697	Celulasa	5 ku	NC -
490698	Macerozima	1 g	NC -
490699	Pectinasa	5 ku	NC -
490700	Pectoliasa	25 ml	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB