Tampón en polvo ClearLine® para electroforesis de ácidos nucleicos



Rápido y fácil de usar.

- 1 bolsa permite realizar 1 litro de tampón 1X
- No es necesario ajustar el pH

Ref.	Descripción	Composición	pH	Unid./ caja	€/ caja
257081	TamponesTAE (Tris-Acetate-EDTA)	40 mM Tris, 20 mM acetic acid, 1 mM EDTA	8,2 - 8,4	100	**NC -**

Tampón de electroforesis de ácido nucleico

Soluciones tampón de electroforesis

Ref.	Descripción	€
348604	TAE 10X, grado BM, 1 l	**NC -**
348603	TAE 10X, grado BM, 5 l	**NC -**
348605	TAE 50X, grado BM, 1 l	**NC -**
091582	TBE 10X, grado BM, 500 ml	**NC -**
348613	TBE 10X, grado BM, 1 l	**NC -**
348615	TBE 10X, grado BM, 5 l	**NC -**

Tampones de conservación en solución

Ref.	Descripción	€
348619	TE 1X pH 8,0, grado BM, 500 ml	**NC -**
091576B	TE 1X pH 8,0, grado BM, 1 l	**NC -**
348618	TE 1X pH 8.0 low EDTA, grado BM, 500 ml	**NC -**
348617	TE 1X pH 8.0 low EDTA, grado BM, 1 l	**NC -**

Tampones de hibridación

Ref.	Descripción	€
091568B	SSC 20X, grado BM, 1 l	**NC -**

Tampones de lavado

Ref.	Descripción	€
702678	TBS 10X pH 7,4, grado BM, 6 x 1 l	**NC -**

Tampones TAE concentrados

El tampón TAE (Tris-Acetato-EDTA) se utiliza en la electroforesis en gel de agarosa para aplicaciones que requieren una alta resolución y una separación de bajo voltaje y alto peso molecular del ADN de doble cadena. Las soluciones son microfiltradas asépticamente.

Ref.	Descripción	Envase	€
348603	TAE 10 x BM	5 l	**NC -**
348605	TAE 50 x BM	1 l	**NC -**

Tampón TBE

Ref.	Descripción	Vol. (ml)	€
523253	Tris borato-EDTA 10X	500	**NC -**

Bolsa de tampón en polvo

Para ahorrar el máximo espacio. Disolver en agua pura para obtener la concentración final indicada.

Ref.	Tampón (polvo)	Cantidad final	Composición	€ la bolsa
4905001	TBE 10 x	Una bolsa para 10 litros de concentración 1 x	1 x contenido : 89 mM Tris, 89 mM borato, 1 mM EDTA, pH 8,2 - 8,4	**NC -**
4905005	SSC 10 x	Una bolsa para 10 litros de concentración 1 x	1 x contenido : 150 mM NaCl, 15 mM citrato de sodio, pH 7,8 - 8,1	**NC -**