Proteínas / Cromatografía / Size Exclusion Chromatography

Columna de cromatografía Superdex

cytiva

Superdex 200 Increase 10/300 GL : para purificaciones preparatorias (volumen del orden de ml) y para el análisis y la caracterización de proteínas con un peso molecular entre 10.000 y 600.000 (como los anticuerpos).
Superdex 200 Increase 3,2/300 : para purificaciones preparatorias de muy bajo volumen (µl) y para el análisis y la caracterización de proteínas con un peso molecular entre 10000 y 600000 (como los anticuerpos).
Superdex 200 Increase 5/150 GL para el control rápido de la pureza y el «screening» del tamaño de las proteínas.
Superdex 75 Increase mejora la resolución de las proteínas con un peso molecular de 44.000 o menos.

Ref.	Descripción	€
28-9909-44	Superdex 200 Increase 10/300 GL	**NC -**
28-9909-45	Superdex 200 Increase 5/150 GL	**NC -**
28-9909-46	Superdex 200 Increase 3,2/300 GL	**NC -**
29-1487-21	Superdex 75 Increase 10/300 GL	**NC -**
29-1487-22	Superdex 75 Increase 5/150 GL	**NC -**
29-1487-23	Superdex 75 Increase 3,2/300 GL	**NC -**

+ info en nuestras WEB

Proteínas / Cromatografía / Proteínas marcadas / > inmovilización de ligandos, purificación de anticuerpos, otras columnas, intercambio iónico, kits

Columnas Superose 6 Increase

cytiva



- Separación rápida y análisis de proteínas y otras biomoléculas por cromatografía de exclusión
- Purificación de complejos proteicos, proteínas de membrana y otras macromoléculas
- Screening de pesos moleculares de una solución desconocida
- Ideal para aplicaciones preparatorias y analíticas, especialmente para grandes proteínas y complejos proteicos
- Resiste a la limpieza repetida con alto pH: larga vida útil y resultados reproducibles

Tipo	10/300 GL	50/150 GL	3,2/300 GL
Ref.	**29-0915-96**	**29-0915-97**	**29-0915-98**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Cuantificación de proteínas

Reactivo de Bradford

PanReac AppliChem ITW Reagents

- Permite realizar un ensayo colorimétrico para cuantificar la concentración total de proteínas
- Medición de la absorbencia a 595 nm

Ref.	Descripción	€
548701	Reactivo Bradford 500 ml	**NC -**

Reactivos de dosis de proteínas por BCA

- Ensayo colorimétrico en presencia de ácido bicinchonínico para medir la concentración de proteínas
- Medición de la absorbencia a 562 nm
- Rango lineal : 5 - 1000 µg/ml
- El kit se suministra con un estándar

Ref.	Descripción	€
115836	Kit de ensayo de proteínas BCA, 250 pruebas	**NC -**
115837	Kit de ensayo de proteínas BCA, 500 pruebas	**NC -**

Reactivo para la cuantificación de proteínas por el método de Lowry

- Para ensayos colorimétricos de proteínas a 660 nm en microcuvetas
- Sensibilidad: 50 µg de proteína / ml
- Listo para usar, incluye un estándar de proteínas (BSA)

Ref.	Descripción	€
215433	Reactivo de análisis por método Lowry, 250 reactivos de 2 ml	**NC -**

NUEVO