
Membrana y Papel Blotting para proteínas

Membranas de transferencia Immobilon™



Membranas de transferencia Immobilon™ Ny+

Para una mayor sensibilidad durante la rehibridación. Membranas Immobilon-Ny+ optimizadas para una transferencia, inmovilización, hibridación y rehibridación fiables y reproducibles.

Ref.	Ref. Merck Millipore	Porosidad (µm)	Presentación	Dim. (mm)	Unid./caja	€/caja
044067	INYC00010	0,45	Rollo	300 x 3300	1	**NC -**

Membranas de transferencia Immobilon-FL (PVDF)

Optimizado para aplicaciones con detección de fluorescencia

- Las mismas características que el immobilon-P en términos de fijación (PVDF, 0,45 µm)
- Ruido de fondo muy bajo en la detección de fluorescencia en western blotting
- Compatible con los reactivos de fluorescencia más utilizados
- Compatible con reactivos de detección no fluorescentes

Ref.	Ref. Merck Millipore	Porosidad (µm)	Presentación	Dim. (mm)	Unid./caja	€/caja
051587	IPFL10100	0,45	Hojas	100 x 100	10	**NC -**
051588	IPFL20200	0,45	Hojas	200 x 200	10	**NC -**
051589	IPFL00010	0,45	Rollo	265 x 3750	1	**NC -**

Membranas de Transferencia Sandwiches Immobilon (PVDF)

- Precortadas
- Se suministra con tampón, separadores y hojas absorbentes
- Compatible con geles preparados

Ref.	Ref. Merck Millipore	Porosidad (µm)	Presentación	Dim. (mm)	Unid./caja	€/caja
051590	IPSN07852	0,45	Hojas	70 x 84	20	**NC -**
051591	IPSN08132	0,45	Hojas	85 x 135	20	**NC -**

Membranas de transferencia Immobilon-NC (ésteres de celulosa)

Membranas Immobilon-NC HAHY de ésteres de celulosa con tensioactivos, lo que mejora su humectabilidad y facilita su manipulación durante el proceso de transferencia.

Ref.	Ref. Merck Millipore	Porosidad (µm)	Presentación	Dim. (mm)	Unid./caja	€/caja
044055	HATC00010	0,45	Rollo	330 x 3000	1	**NC -**

Membranas de transferencia Immobilon-P (PVDF)

En fluoruro de polivinilideno (PVDF), hidrofóbicas, optimizadas para fijar las proteínas transferidas desde diferentes tipos de geles.

- Sustrato ideal para la inmunodetección
- Utilizando el protocolo rápido desarrollado por Merck Millipore, ahorro de tiempo de 2 horas: eliminación del paso de bloqueo durante un western blot, reducción del número y duración de los lavados, sin comprometer la especificidad ni la sensibilidad

Ref.	Ref. Merck Millipore	Porosidad (µm)	Presentación	Dim. (mm)	Unid./caja	€/caja
044081	IPVH07850	0,45	Hojas	70 x 84	50	**NC -**
044082	IPVH304F0	0,45	Hojas	260 x 260	10	**NC -**
044083	IPVH09120	0,45	Hojas	90 x 120	10	**NC -**
044084	IPVH10100	0,45	Hojas	100 x 100	10	**NC -**
044085	IPVH20200	0,45	Hojas	200 x 200	10	**NC -**
044086	IPVH15150	0,45	Hojas	150 x 150	10	**NC -**
044087	IPVH00010	0,45	Rollo	265 x 3750	1	**NC -**

Membranas de transferencia Immobilon-PSQ (PVDF)

En fluoruro de polivinilideno (PVDF) para la transferencia de proteínas de bajo peso molecular.
Membranas Immobilon-PSQ: para el blotting de proteínas de ‹ 20 kD.

- Alto rendimiento en la secuenciación de proteínas
- Sin tensioactivos

Ref.	Ref. Merck Millipore	Porosidad (µm)	Presentación	Dim. (mm)	Unid./caja	€/caja
044088	ISEQ00010	0,2	Rollo	265 x 3750	1	**NC -**
044089	ISEQ15150	0,2	Hojas	150 x 150	10	**NC -**
044090	ISEQ101000	0,2	Hojas	100 x 100	10	**NC -**
044091	ISEQ20200	0,2	Hojas	200 x 200	10	**NC -**
044092	ISEQ26260	0,2	Hojas	260 x 260	10	**NC -**

Membranas de transferencia Immobilon-E (PVDF)

- No requieren de etapa de activación de la membrana con metanol
- Mejor retención de proteínas y durabilidad que las membranas de nitrocelulosa
- Se puede humedecer directamente con tampón de transferencia
- Métodos de detección compatibles: quimioluminiscencia, cromogénico y radiactividad
- Compatible con azul Coomassie, rojo Ponceau-S, Sypro Ruby y colorantes a base de oro coloidal
- Las membranas Ref.s 044435 et 044436 incluyen hojas de papel blotting

Ref.	Ref. Merck Millipore	Porosidad (µm)	Presentación	Dim. (mm)	Unid./caja	€/caja
044430	IEVH00005	0,45	Rollo	265 x 1875	1	**NC -**
044431	IEVH07850	0,45	Hojas	70 x 84	50	**NC -**
044432	IEVH08100	0,45	Hojas	80 x 100	10	**NC -**
044433	IEVH09120	0,45	Hojas	90 x 120	10	**NC -**
044434	IEVH10100	0,45	Hojas	100 x 100	10	**NC -**
044435	IESN07852	0,45	Hojas	70 x 84	20	**NC -**
044436	IESN08132	0,45	Hojas	85 x 135	20	**NC -**
044437	IEVH07804	0,45	Hojas	70 x 84	4	**NC -**

Anticuerpos para blotting

Anticuerpos HRP anti-IGG, Amersham

- Para Western blotting
- Optimizados para su uso junto con los reactivos de detección Amersham ECL
- Anticuerpos dirigidos contra las IgG, conjugados con peroxidasa de rábano picante
- Forma clásica (anticuerpo completo) o fragmento $F(ab')_2$
- La forma del fragmento $F(ab')_2$ elimina las interacciones inespecíficas de la fracción Fc, facilita la penetración en las células y no interfiere con los anticuerpos anti-Fc

Fuente	Objetivo	Forma	Ref.	Envase	€
Oveja	IgG	Ratón	Fragmento $F(ab')_2$	**NA9310-1ML**	1 ml	**NC -**
Mono		Conejo		**NA9340-1ML**	1 ml	**NC -**
Oveja		Humano	Clásica	**NA933-1ML**	1 ml	**NC -**
Oveja		Ratón		**NA931-1ML**	1 ml	**NC -**
Mono		Conejo		**NA934-1ML**	1 ml	**NC -**
		Ratón		**NA931-100UL**	100 µl	**NC -**
		Conejo		**NA934-100UL**	100 µl	**NC -**
Cabra		Rata		**NA935**	1 ml	**NC -**

ECL Plex GaM IgG

Astucia: Consultar para los anticuerpos secundarios acoplados a HRP

Ref.	Descripción	€
PA45009	ECL Plex GaM IgG, CY5, 150 µg	**NC -**
PA45011	ECL Plex GaR IgG, CY5, 150 µg	**NC -**
PA43009	ECL Plex GaM IgG, CY3, 150 µg	**NC -**
28-9011-06	ECL Plex GaR IgG Cy3 150 µg	**NC -**