Superficies de fijación por afinidad



Immobilizer Streptavidin : la estreptavidina se fija covalentemente a la superficie mediante un brazo espaciador para evitar la pérdida de moléculas y mejorar la precisión. La superficie también se modifica para minimizar la fijación no específica. Esto permite obtener una elevada relación señal/ruido, para una mayor sensibilidad. Una capacidad de fijación de biotina de 20 pmol por pocillo produce excelentes resultados analíticos.

Placas 96 pocillos

Configuración	Tipo	Color	Vol. de pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
F96	Pinchbar	Transparente	400	1	15	**056211**	**NC -**
F96	Pinchbar	Blanco	400	1	15	**056212**	**NC -**
F96	Pinchbar	Negro	400	1	15	**056213**	**NC -**
F384	Pinchbar	Transparente	120	1	15	**056255**	**NC -**

Tiras

Configuración	Tipo	Color	Vol. de pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
F8	No divisible	Transparente	400	1	15	**056214**	**NC -**
C8	Divisible/ Lockwell	Transparente	350	1	15	**056215**	**NC -**

Accesorios

Ref.	Compatibilidad	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
055612	C8 divisible	5	60	**NC -**
055165	F8,C8, U8, F16, U16	5	60	**NC -**



¿BUSCAS UNA REFERENCIA?

ENTRA EN CUALQUIER WEB DEL GRUPO DUTSCHER

Group Dutscher IBERICA



teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com