B.C.P. -Agar con lactosa púrpura de bromocresol - ISO 21528

Medio diferencial para guiar la identificación de Enterobacteriaceae fermentadoras de lactosa y no fermentadoras de lactosa.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (Medio deshidratado y medio listo para usar)
- Incubación: 35 ± 2 °C durante 18 a 24 h

Medio deshidratado

Ref.	Descripción	Cant.	€
777186	Medio deshidratado para agar B.C.P con lactosa - Condalab	500 g	NC -

Listo para usar

Ref.	Descripción	Cant.	€
693351	Frasco de 100 ml para el Agar lactosa púrpura con bromocresol - ClearLine®	10	NC -

B.E.A - Azida de esculina biliar (agar) ISO 7899-2

Para el aislamiento e identificación selectiva de enterococos por el método de filtración por membrana.



- Almacenamiento: 2 - 25 °C (base deshidratada y medio listo para usar)
- Incubación: 36 ± 2° C durante 44 ± 4 h

Base deshidratada

Ref.	Descripción	Cant.	€
777191	Medio deshidratado para agar B.E.A. (agar azida esculina biliar) - ISO 7899-2 - Condalab	500 g	NC -

Medio listos para usar

Ref.	Descripción	Cant.	€
693352	Frasco de 100 ml de agar B.E.A. (agar azida esculina biliar) - ISO 7899-2 - ClearLine®	10	NC -

B.E.A - Azida de esculina biliar (agar) ISO 10273

Para el aislamiento e identificación de enterococos y el estudio de la fermentación de esculina por Yersinia.



- Almacenamiento: 2 - 25 °C
- Incubación: 35 ± 2 °C durante 18 - 24 h
- Para la detección de Yersinia enterocolitica según la norma ISO 10273 : 30 °C durante 24 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777189	Medio deshidratado para agar B.E.A. (agar azida esculina biliar) - ISO 10273 - Condalab	500 g	NC -

B.L.B.V.B. - Caldo lactosado verde brillante 2%

Para la detección de coliformes en agua y alimentos

- Almacenamiento: 2 - 8 °C
- Incubación: 30 - 37 °C durante 24 - 48 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777201	Medio deshidratado caldo verde brillante 2% - Condalab	500 g	NC -

Blood agar

Ver Agar de sangre

Caldo EE

Ver caldo mossel

Caldo de corazón cerebro

Ver caldo corazón-cerebro

Caldo Eugon LT100

Ver eugon LT100

Caldo de levadura y moho

Ver Yeast Mold broth

Caldo sLB tamponado

Ver caldo sLB

Caldo Terrific

Utilizado con glicerol para el cultivo de cepas recombinantes de Escheriachia coli. Para biología molecular.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C
- Incubación: 30 °C ± 2 °C durante 18 - 24 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777505	Medio deshidratado caldo terrific - Condalab	500 g	NC -

Bryant Burkey con resazurina (caldo)

- Almacenamiento: 2 - 25 °C
- Incubación: 37 ± 2°C durante 7 días

Ref.	Descripción	Cant.	€
777207	Medio deshidratado caldo Bryant Burkey con resazurina - Condalab	500 g	NC -

Campylobacter (agar) - ISO 10272 / ISO 11133

Para el aislamiento de Campylobacter jejuni, Campylobacter coli y Campylobacter laridis.

- Almacenamiento: 8 - 25 °C
- Incubación: 41,5 °C en atmósfera microaeróbica durante 44 ± 4 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777213	Medio deshidratado para agar Campylobacter - Condalab	500 g	NC -

Suplemento

- ISO 10272
- Para reconstituir en 5 ml de agua destilada estéril

Ref.	Descripción	Cant.	€
777776	Suplemento para agar Campylobacter - Condalab	10 viales para 500 ml	NC -

CCA (Chromogenic coliform agar)

Ver E coli - coliforme

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB