Mac Conkey (caldo) - según la farmacopea

Para la detección de coliformes en agua, leche y preparados farmacéuticos.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (base deshidratada y medio listo para usar)
- Incubación: 42 - 44 °C durante 24 - 48 h

Base deshidratada


Ref.	Descripción	Cant.	€
777303	Medio deshidratado caldo Mac Conkey - Condalab	500 g	NC -

Medio listos para usar

Ref.	Descripción	Cant.	€
693302	Frasco de 100 ml caldo Mac Conkey - ClearLine®	10	NC -

Mac Conkey (agar) - según la farmacopea

Medio diferencial para guiar la identificación de Enterobacteriaceae fermentadoras de lactosa y no fermentadoras de lactosa.
Se recomienda para la detección de Escherichia coli en agua, alimentos, productos lácteos y preparados farmacéuticos.



Enterobacter aerogenes — Escherichia coli

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (base deshidratada y medio listo para usar)
- Incubación
- Según ISO 21567 : 37 ± 1 °C durante 20 - 24 h
- Según ISO 21150 : 30 - 35 °C durante 24 h

Base deshidratada

Ref.	Descripción	Cant.	€
777298	Medio Deshidratado agar Mac Conkey - Condalab	500 g	NC -

Medios listos para usar

Ref.	Descripción	Cant.	€
693369	Frasco de 100 ml caldo Mac Conkey* - ClearLine®	10	NC -
693448	Frasco de 100 ml caldo Mac Conkey* - ClearLine®	6	NC -

* No conforme con la farmacopea

Malta (caldo)

Caldo para aislamiento y el cultivo de levaduras y mohos.

- Almacenamiento 2 - 25 °C
- Incubación: 30 ± 2 °C durante 18 - 72 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777305	Medio deshidratado caldo extracto de malta - Condalab	500 g	NC -

Malta (Agar)

Recomendado para la detección, aislamiento y recuento de levaduras y mohos.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (Base deshidratada) - 2 - 8°C (medio listo para usar)
- Incubación: 25 - 30 °C durante 18 - 72 h

Base deshidratada

Ref.	Descripción	Cant.	€
777304	Medio deshidratado agar extracto de malta - Condalab	500 g	NC -

Medios listos para usar

Ref.	Descripción	Cant.	€
693437	Tubo inclinado de agar extracto de malta - ClearLine®	100	NC -
693370	Frasco de 100 ml agar extracto de malta - ClearLine®	10	NC -

Manitol Movilidad Nitrato

Utilización para la identificación presuntiva de Enterobacteriaceae basada en la fermentación del manitol, la movilidad del germen y el poder de reducción de nitrato a nitrito.

- Almacenamiento: 2 - 25 °C (base deshidratada) - 2 - 8°C (medio listo para usar)
- Incubación: 35 ± 2 °C durante 18 - 24 h

Base deshidratada

Ref.	Descripción	Cant.	€
777306	Medio deshidratado manitol Movilidad Nitrato - Condalab	500 g	NC -

Medios listos para usar

Ref.	Descripción	Cant.	€
693461	Tubo de 10 ml manitol movilidad nitrato - ClearLine®	6	NC -
693412	Tubo de 10 ml manitol movilidad nitrato - ClearLine®	100	NC -

Manitol salado (Mannitol salt Agar - MSA)

Ver agar Chapman

Marina (Agar)


Para el aislamiento y recuento de bacterias marinas heterotrópicas.

- Almacenamiento: 2 - 8 °C
- Incubación: 20 - 25 °C durante 24 - 72 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777309	Medio deshidratado agar marino - Condalab	500 g	NC -

M-EI (agar cromogénico)

Para la detección y el recuento de Enterococcus en el agua por el método de filtración en membrana.




- Almacenamiento: 2 - 25 °C
- Incubación: 41 ± 0,5 °C durante 18 - 24 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
777310	Medio deshidratado para agar cromogénico M-EI - Condalab	500 g	NC -

M-EI modificado (agar cromogénico)

Para el aislamiento y la diferenciación de Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium



- Almacenamiento: 2 - 8 °C
- Incubación: 41 ± 0,5 °C durante 18 - 24 h

Ref.	Descripción	Cant.	€
778436	Medio deshidratado para agar cromogénico M-EI modificado - Condalab	500 g	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB