Tampons

Tampons TAE concentré

Référence	Désignation	Conditionnement	€ HT
348605	TAE 50 x BM	1 l	NC-

Le tampon TAE (Tris-Acétate-EDTA) est employé dans l'électrophorèse de gel d'agarose pour des applications exigeant une haute résolution et une séparation, sous une tension basse d'un poids moléculaire poids élevé, d'ADN bicaténaire. Les solutions sont aseptiquement microfiltrées.

Tampons TAE concentré pour gels d'électrophorèse

Référence	Désignation	Vol. (ml)	€ HT
523252	Tris acetate-EDTA 50X	500	NC -

Prêts à l'utilisation. Calibrés pour fournir des bandes nettes.

Tampons TBE concentrés

Tampon TBE concentré x 10
Pour la biologie moléculaire. Tampon d'électrophorèse.

Référence	Désignation	Conditionnement	€ HT
523253	TBE 10 x BM	500 ml	NC -
348613	TBE 10 x BM	1 l	NC -

Tampons TBE

Réf.	Désignation	Vol. (ml)	€ HT
523253	Tris borate-EDTA 10X	500	NC -

Sachet de tampon en poudre

Pour un gain de place maximal. A dissoudre dans de l'eau pure pour obtenir la concentration finale indiquée.

Référence	Tampon (poudre)	Quantité finale	Composition	€ HT le sachet
4905001	TBE 10 x	Un sachet pour 10 litres de concentration 1 x	1 x contenu : 89 mM Tris, 89 mM borate, 1 mM EDTA, pH 8,2 - 8,4	NC -
4905005	SSC 10 x	Un sachet pour 10 litres de concentration 1 x	1 x contenu : 150 mM NaCl, 15 mM sodium citrate, pH 7,8 - 8,1	NC -

Acide borique

Référence	Désignation	Conditionnement	€ HT
091516	Acide borique BM	1 kg	NC -

TRIS

Référence	Désignation	Conditionnement	€ HT
091572B	TRIS BM	1 kg	NC -

Acide éthylenediaminetetraacetique


Référence	Désignation	Conditionnement	€ HT
348307	Acide éthylenediaminetetraacetique sel disodique 0,05 M	1000 ml	NC -

Accessoires

Découpeur de bandes de gel d'agarose

- **Excision de bandes de gel propre et de taille reproductible de 6 x 3 mm**
- **Usage unique pour éviter les contaminations**
- **Ne raye pas la surface des tables UV**

Référence	Désignation	Nombre de réactions	€ HT
523337	Découpeur de bandes de gel d'agarose	50	NC -





Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be