Membrane et papier blotting pour acides nucléiques

Membrane de transfert en nylon Nytran Super Charge (SPC)

- Charge positive très forte, faible bruit de fond
- La densité de nylon plus forte qu'avec d'autres membranes augmente la capacité de fixation des échantillons
- Excellente symétrie : reste toujours plate
- La membrane Nytran Super Charge fixe neuf fois plus de molécules qu'une membrane en nylon classique
- Morphologie constante de la membrane : bonne uniformité de la répartition du nylon et donc des charges

Réf.	Nytran SuperCharge	Dim. (mm)	Type	Unités/ carton	€ HT/ carton
034779	0,45 µm	110 x 140	Feuilles	10	NC -
034798	0,45 µm	200 x 3 m	Rouleaux	1	NC -
034799	0,45 µm	300 x 3 m	Rouleaux	1	NC -

Membranes de blotting Amersham™ HYBOND



Référence	Dimensions	Taille des pores	Matériau de la membrane	€ HT le rouleau
Hybond-N en nylon neutre				
RPN303N	30 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon	NC -
RPN203N	20 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon	NC -
Hybond-N + en nylon chargé positivement, polyvalent				
RPN303B	30 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon chargé positivement	NC -
RPN203B	20 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon chargé positivement	NC -
Hybond-NX en nylon neutre, pour des applications plus exigeantes				
RPN303T	30 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon	NC -
RPN203T	20 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon	NC -
Hybond-XL en nylon optimisé pour sondes radio-marquées				
RPN303S	30 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon chargé positivement	NC -
RPN203S	20 cm x 3 m	0,45 µm	Nylon chargé positivement	NC -

Autres dimensions disponibles : nous consulter.

Hybond-N

- Résistante
- Pour le blotting d'acides nucléiques
- Capacité de fixation 600 µg/cm²
- Pour application radioactives
- Fixation par lumière UV

Hybond-N+

- Pour le blotting d'acides nucléiques
- Capacité de fixation 600 µg/cm²
- Pour détection par radioactivité, chemiluminescence, chemifluorescence

Hybond-NX

- Pour le blotting d'acides nucléiques
- Capacité de fixation 600 µg/cm²
- Développé spécifiquement pour un usage avec de faibles volumes de tampon d'hybridation et les applications à haut débit
- Génère peu de bruit de fond

Hybond-XL

- Pour le blotting d'acides nucléiques
- Capacité de fixation 600 µg/cm²
- Fixation efficace des petits fragments
- Nylon chargé pour un rapport signal/bruit optimisé dans le cas d'un travail sur des échantillons marqués par radioactivité

