## Lamelles stériles

- Flux : film plastique en surface (épaisseur 188 µm), pour la microscopie confocale à haute résolution
- Pour l'adhésion des cellules
- Résistantes

Cyto-toxines · DNase RNase · ADN humain · Pyro-gènes




| Référence | Ø (mm) | Pour plaque | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|
| 330169 | 9 | 48 puits | 200 | NC - |
| 330164 | 12 | 24 puits | 200 | NC - |
| 330165 | 18 | 12 puits | 200 | NC - |
| 330170 | 25 | 6 puits | 200 | NC - |

## Lames StarFrost en verre

- Lames porte objet de haute-définition en verre blanc hydrophile
- Haute transparence pour une visualisation au microscope améliorée
- Plage d'identification colorée pour une identification aisée de la lame
- Dimensions : 26 x 76 mm, épaisseur : 1 mm
- Disponibles avec marquage CE et IVD, à préciser à la commande

| Bord | Blanc | Jaune | Bleu | Rose | Vert | Orange | € HT/ boîte de 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupé | 100204 | 100204J | 100204B | 100204R | 100204V | 100204O | NC - |
| Rodé 90° | 100205 | 100205J | 100205B | 100205R | 100205V | 100205O | NC - |
| Rodé 45° | 100206 | 100206J | 100206B | 100206RS | 100206V | 100206O | NC - |
| Rodé biseauté | 100283 | 100284 | 100287 | 100285 | 100286 | 100288 | NC - |



Bord coupé · Bord rodé 45° · Bord rodé 90° · Bord rodé biseauté

## Lames SuperFrost en verre

- En verre sodocalcique
- Dimensions : 26 x 76 mm, épaisseur : 1 mm

| Bord | Blanc | Jaune | Bleu | Rose | Vert | € HT la boîte de 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupé | 100204M | 100204MJ | 100204MB | 100204MR | 100204MV | NC - |
| Rodé 90° | 100205M | - | - | - | - | NC - |
| Rodé 45° | 100206M | 100206MJ | 100206BM | 100206MR | 100206MV | NC - |

## Lames à traitement spécifique Superfrost Plus, Polysine


### Lame SuperFrost Plus Gold

Lame pour hybridation in situ, immunocytochimie, colorants spéciaux. Super-adhésion spéciale : une technologie de fabrication particulière donne à ces lames une adhésion permettant la fixation des tissus sans spray ni fixateur. Mode d'emploi : laisser la lame à température ambiante une minute avant de déposer le tissu, le pouvoir de fixation augmentant dans le temps. Compatible avec le bleu de toluidine, l'hématoxyline, l'éosine.

- Les tissus sont fixés de manière covalente
- L x l (mm) : 75 x 25 mm

### Lame SuperFrost Plus ESCO

- Super-adhésion par charge positive
- Garantie exempte de poussières et de film gras
- Adhésion des échantillons congelés et préparations cytologiques sur la lame
- Pas de spray, pas de fixateur nécessaire
- Pas de résidus de colorants
- L x l (mm) : 75 x 25 mm
- Surface d'inscription



### Lame de microscopie Polysine ESCO

Spéciale biologie moléculaire. Par ses propriétés électrostatiques, la lame polysine possède une adhérence optimale pour tous tissus et cellules. Inerte aux produits chimiques, au chauffage et à la prédigestionenzymatique. Exempte de nucléase, idéale pour l'hybridation de l'ADN.

| Référence | Désignation | Unités/ boîte | € HT/ boîte |
|---|---|---|---|
| 045795 | Lame Superfrost Plus Gold | 72 | NC - |
| 045796 | Lame Superfrost Plus ESCO | 72 | NC - |
| 045797 | Lame de microscopie Polysine ESCO | 72 | NC - |



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be