Neutralisant Vétérinaire

Le mélange de neutralisant est ajouté au milieu de pré-enrichissement chaque fois que la présence de solution désinfectante est connue ou suspectée. D'une façon générale, ce mélange doit être utilisé à raison de 10 % du volume final du milieu de pré-enrichissement.

➤ **Stockage 15 - 25 °C à l'obscurité**

Formule en g/l			
Phosphate disodique	85,7	**L-Histidine HCL**	1
Thiosulfate de sodium	5	**Tween 80**	15
Lécithine	3	**Eau distillée**	890,3

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
693472	Neutralisant vétérinaire ClearLine® Flacon Twist-off 900 ml	9	**NC -**

Nitrate mobilité (Gélose)

Milieu pour la confirmation des clostridium perfringens.

➤ **Stockage : 2 - 25 °C**

➤ **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 24 - 48 h**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777327	Milieu déshydraté milieu nitrate mobilité - Condalab	500 g	**NC -**

Nocive bactérie pour les brasseries (Bouillon)

Pour la détection des contaminants nocifs en brasserie.

➤ **Stockage : 2 - 25 °C**

➤ **Incubation : 30 - 35 °C pendant 4 jours**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777863	Milieu déshydraté pour gélose Nocive Brewers bacteria Broth base modified - Condalab	500 g	**NC -**

Nocive bactérie pour les brasseries (Gélose)

Pour la détection des contaminants nocifs en brasserie.

➤ **Stockage : 2 - 25 °C**

➤ **Incubation : 30 - 35 °C pendant 4 jours**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777862	Milieu déshydraté pour bouillon Nocive Brewers bacteria Agar base modified - Condalab	500 g	**NC -**

Nutritif (Bouillon)

Pour la culture de germes non exigeants

➤ **Stockage : 2 - 25 °C**

➤ **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 48 h**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777332	Milieu déshydraté pour bouillon nutritif - Condalab	500 g	**NC -**

Gélose nutritive

Milieu pour la culture des germes non exigeants dans l'eau et échantillons clinique.

➤ **Stockage : 2 - 25 °C**

➤ **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 24 h**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777328	Milieu déshydraté pour gélose nutritive ISO 6579 / ISO 10273 - Condalab	500 g	**NC -**

Gélose nutritive avec chlorure de sodium ISO 21258

Milieu recommandé par la norme ISO 21528 pour la confirmation des entérobactéries.

➤ **Stockage : 2 - 25 °C (Base déshydratée et milieu prêt à l'emploi)**

➤ **Incubation : 37 ± 1 °C pendant 24 ± 2 h**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777331	Milieu déshydraté pour gélose nutritive avec chlorure de sodium ISO 21258 - Condalab	500 g	**NC -**

Milieu prêt à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
693374	Flacon 100 ml gélose nutritive avec sodium chlorure - ClearLine®	10	**NC -**

O.G.A. (Oxytétracycline Glucose Agar - Gélose) (O.G.Y.E.)

Recommandé pour le dénombrement des levures et moisissures dans le lait, les produits laitiers et les aliments.

➤ **Stockage : 2 - 25 °C (Base déshydratée et milieu prêt à l'emploi)**

➤ **Incubation : 20 - 25 °C pendant 5 - 7 jourss**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777335	Milieu déshydraté pour gélose O.G.A (O.G.Y.E.) - Condalab	500 g	**NC -**

Milieu prêt à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
693373	Flacon 100 ml gélose O.G.A. (O.G.Y.E.) - ClearLine®	10	**NC -**

Supplément

Pour 500 ml de milieu.

➤ **Ajouter 50 mg d'oxytétracycline dans 5 ml d'eau distillée stérile**

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
777791	Oxytétracycline - Flacon de 50 mg - Condalab	10	**NC -**

Osmophilique (Gélose)

Pour la recherche des levures osmophilies dans les aliments.

➤ **Stockage : 2 - 25 °C**

➤ **Incubation : 20 ± 20 °C pendant 48 - 72 h**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777337	Milieu déshydraté pour gélose osmophilique - Condalab	500 g	**NC -**

Ox bile bactériologique

Ingrédient utilisé comme un agent inhibiteur sélectif dans des milieux de culture comme le BLBVB

➤ **Stockage : 2 - 25 °C**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777448	Bile Ox bactériologique - Condalab	500 g	**NC -**
778405	Bile Ox bactériologique - Condalab	25 kg	**NC -**