Salmonella gélose chromogénique



Milieu pour l'isolation des salmonelles spp dans les échantillons cliniques, l'eau et les industries agro-alimentaires.

- **Stockage : 2 - 8 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 24 h**


Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777376	Milieu de base chromogénique pour isolation salmonelle - Condalab	500 g	NC -

Supplément

- **Mix antibiotique - A reconstituer dans 5 ml d'eau distillée stérile**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
778404	Supplément mix antibiotique	10 flacons pour 500 ml	NC -

Slanetz et Bartley (Gélose)




Utilisé pour l'isolement et le dénombrement des entérocoques dans les eaux, les denrées alimentaires par la technique de membranes filtrantes ou isolement sur les boîtes de Pétri. Conforme ISO 11133 / ISO 7899-2.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 36 ± 2 °C pendant 44 ± 4 h**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777389	Mlieu déshydraté gélose Slanetz et Bartley - Condalab	500 g	NC -

S.S. (Salmonella Shigella - Gélose)



Salmonella typhimurium

Pour la sélection et l'isolement des salmonelles et shigelles.

- **Stockage : 2 - 25 °C (base déshydratée et milieu prêt à l'emploi)**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 24 h**


Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777378	Milieu déshydraté gélose S.S. - Condalab	500 g	NC -

Milieu prêt à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
693385	Flacon 100 ml gélose S.S. - ClearLine®	100	NC -

S.S. modifié (Salmonella Shigella - Gélose)



Salmonella typhimurium — Shigella sonnei

Pour la sélection et l'isolement des salmonelles et shigelles.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 24 h**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777379	Milieu déshydraté gélose S.S. modifié - Condalab	500 g	NC -

Sélénite (Bouillon)

Utilisé pour l'enrichissement sélectif de salmonella dans l'eau, les denrées alimentaires et les échantillons cliniques.

- **Stockage : 2 - 8 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 24 h**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777390	Milieu déshydraté gélose Sélénite - Condalab	500 g	NC -

Sélénite cystine (Bouillon)

Utilisé pour l'enrichissement sélectif de Salmonella dans l'eau ou les denrées alimentaires.

- **Stockage : 2 - 8 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 24 h**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777385	Milieu déshydraté gélose Sélénite cystine - Condalab	500 g	NC -

Milieux prêts à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
693417	Tube 10 ml gélose Sélénite cystine - ClearLine®	100	NC -
693386	Flacon 100 ml gélose Sélénite cystine - ClearLine®	10	NC -

SIM (Gélose)

Milieu semi-solide pour la différenciation des entérobactéries.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 24 h**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777387	Milieu déshydraté gélose SIM - Condalab	500 g	NC -

SPS (Sulfite Polymyxine Sulfadiazine - Gélose)

Pour l'isolement et le dénombrement des clostridiums perfringens dans les aliments.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 24 - 48 h**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777391	Milieu déshydraté gélose SPS - Condalab	500 g	NC -

Staphylocoque (Gélose chromogénique)



Milieu chromogénique pour la détection et la différentiation des différentes espèces de staphylocoques.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 24 - 48 h**

Colonies vertes : Staphylococcus epidermidis
Colonies bleues vertes : Staphylococcus saprophyticus
Colonies magenta : Staphylococcus aureus

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
778437	Milieu chromogénique pour Staphylocoques - Condalab	500 g	NC -

Sulfate de fer (Gélose) Iron sulfite agar ISO 15213

Pour le dénombrement des bactéries sulfato réductrices sous conditons anaérobiques.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 37 ± 1 °C pendant 24 - 48 h**

Réf.	Désignation	Cond.	€ HT
777844	Milieu déshydraté gélose sulfate de fer - Condalab	500 g	NC -