Detektion und Blockieren

Amersham AlkPhos Direct™ Systeme direkte Markierung und Detektion Cytiva

Technik, die auf der direkten Markierung von DNA-Sonden basiert oder RNA mit einer hitzestabilen Alkaliphosphatase.
Diese markierte Sonde wird dann an das Ziel hybridisiert.

- **Erkennung durch CDP-Star oder ECF möglich**
- **Verkürzung um 2 bis 3 Stunden im Vergleich zu herkömmlichen indirekten Methoden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Membranfläche	CHF
RPN3680	Alkphos direct labeling module	2500 cm²	AA -
RPN3682	CDP-star detection reagent	2500 cm²	AA -
RPN3685	ECF dectection module	2500 cm²	AA -
RPN3688	Alkphos direct hybridisation buffer	5000 cm²	AA -

Autoradiographiefilme Blu-Blot HS und Blu-Lite UHC



- **Hohe Qualität mit blauem Hintergrund**
- **Verwendbar mit Calciumwolframat-Bildschirmen oder im blauen Bereich emittierend**
- **Kompatibel mit manuellen und automatischen Entwicklungsmethoden**
- **Die UHC-Version bietet einen höheren Kontrast und eine bessere Empfindlichkeit bei geringem Hintergrundrauschen**

Art. Nr.	Version	Maße L x B (mm)	VE	CHF/ VE
062632	Blu-Blot HS	127 x 178	100	AA -
062633	Blu-Blot HS	203 x 254	100	AA -
062666	Blu-Lite UHC	127 x 178	100	AA -
062667	Blu-Lite UHC	203 x 254	100	AA -


Autoradiographie-Filme "Blue devil"



- **Blauer Hintergrund**
- **Einfache Emulsion**
- **Mit Zwischenblättern**
- **Außergewöhnliche Klarheit und geringes Hintergrundrauschen**
- **Zur Verwendung für ^{14}C, ^{35}S, ^{32}P und ^{125}I**
- **Blotting**
- **Sequenzierung**
- **Chemilumineszenz-Autoradiographie**
- **Gelanalyse ("shift gel analysis")**

Art. Nr.	B x L (cm)	CHF zu 100
789173	12,7 x 17,78	AA -
789174	20,32 x 25,4	AA -
789175	25,4 x 30,48	AA -
789176	35,56 x 43,18	AA -

Amersham Hyperscreen Intensivierungs-Filter



Für schnelle und hochempfindliche Ergebnisse beim Nachweis von ^{32}P und ^{125}I in Southern-, Northern- und Western-Blots.
Zur Verwendung mit der Vorblitzlampe.

Art. Nr.	Maße	VE	CHF/ VE
RPN1662	18 x 24 cm	2	AA -

Reblot-Lösungen

Diese Kits enthalten alle Reagenzien zur einfachen Entfernung von Antikörpern nach der Antikörperentwicklung in der Chemilumineszenz.

- **Einfach und schnell (10 bis 20 Minuten)**
- **Anwendung bei Raumtemperatur**
- **Kein Beta-Mercaptoethanol**
- **2 verschiedene Lösungen, je nachdem, wie stark die Interaktion zwischen Antikörper und Antigen ist**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
051965	Lösung Reblot mit plus Mild 50 ml	AA -
051979	Lösung Reblot mit plus Strong 50 ml	AA -