Acetat-Differential-Agar

Siehe Acetat-Differential-Agar

Actinomycete-Isolierungsagar Glycerol

Siehe Agar zur Isolierung von Aktinomyceten

Amerikanischer bakteriologischer Agar

Geliermittel für Kulturmedien.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Gelstärke : 600 - 850 g/cm²**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777475	Amerikanischer bakteriologischer Agar - Condalab	500 g	AA -

Europäischer bakteriologischer Agar

Geliermittel für Kulturmedien.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Gelstärke : 600 - 1100 g/cm²**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777476	Europäischer bakteriologischer Agar Condalab	500 g	AA -
777525	Europäischer bakteriologischer Agar Condalab	5 kg	AA -

Industrieller Agar

Geliermittel für Kulturmedien.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Gelstärke : ‹ 850 g/cm²**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777477	Industrieller Agar Condalab	500 g	AA -

LB-Agar (Lennox)

Siehe LB-Agar

Agar Luria

Siehe Luria-Agar

Pharmazeutischer Agar

Geliermittel für Kulturmedien.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Gelstärke : 750 - 1000 g/cm²**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777479	Pharmazeutischer Agar Condalab	500 g	AA -

Gereinigter Agar

Geliermittel für Kulturmedien.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Gelstärke : 700 - 1200 g/cm²**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777480	Gereinigter Agar Condalab	500 g	AA -

Agar für die pflanzliche Vermehrung

Geliermittel für Kulturmedien.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Gelstärke : › 900 g/cm²**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777478	Agar für die pflanzliche Vermehrung - Condalab	500 g	AA -

Agar YPD

Siehe YPD-Agar

Anaerobes Agar

Siehe Anaerobes-Agar

Bacillus cereus (Selektivagar)

Siehe Moosel (Bacillus cereus agar)

Baird-Parker

Empfohlen für den Nachweis und die Auszählung von koagulase-positiven Staphylokokken, einschließlich Staphylococcus aureus in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (für dehydrierte Medien) und 2 - 8 °C (für gebrauchsfertige Medien)**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 24 - 48 Stunden**
- **Zertifiziert nach der Norm ISO 11133: 37 ± 1 °C für 24 ± 2 Stunden, dann weitere 24 ± 2 Stunden**

Dehydrierte Basen

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777184	Baird-Parker-Agar-dehydriertes Medium - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693396	Baird-Parker ClearLine® Agar - 90 ml Flasche	10	AA -
693350	Baird-Parker ClearLine® Agar - 100 ml Flasche	10	AA -

Zusatz: Eigelb mit Tellurit (ISO 6888-1)

- **Lagerung 8 - 14 °C**

Zusammensetzung:

Kaliumtellurit	2,1 g	Natriumchlorid	4,25 g
Eigelb	200 ml	Destilliertes Wasser	800 ml

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777800	Eigelb 100 ml Flasche - Condalab	1	AA -

Ergänzungsmittel : RPF (ISO 6888-2)

- **Lagerung: 8 - 14 °C**

Zusammensetzung:

Kaliumtellurit	2,5 mg	Trypsin	2,5 mg
Kaninchen-Plasma	2,5 ml	Rinderfibroblast	0,38 g

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777523	RPF-Ergänzung - Condalab	10 Flaschen	AA -

Stickstoffbasis für aminosäurefreie Hefe

Zur Klassifizierung von Hefen nach ihrem Aminosäure- und Kohlenhydratbedarf.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation : 25 - 30°C für 2 - 5 Tage**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777508	Dehydriertes Medium auf Stickstoffbasis für aminosäurefreie Hefe - Condalab	500 g	AA -