B.C.P. Laktose-Agar mit violett Bromkresol - ISO 21528

Differenzialmedium zur Anleitung der Identifizierung von laktosefermentierenden und nicht-laktosefermentierenden Enterobacteriaceae.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (Dehydratisiertes Medium und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation : 35 ± 2 °C für 18 bis 24 Stunden**

Dehydriertes Medium

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777186	Dehydriertes Medium für B.C.P. Laktoseagar - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertig

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693351	100 ml Flasche für Bromkresol Purple Lactose Agar - ClearLine	10	AA -

B.E.A - Galle Esculin Azid (Agar) ISO 7899-2

Für die selektive Isolierung und Identifizierung von Enterokokken durch die Membranfiltrationsmethode.



- **Lagerung 2 - 25 °C (dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation : 36 ± 2° C für 44 ± 4 h**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777191	Dehydriertes Medium für B.E.A.-Agar (Galle Esculin-Azid-Agar) - ISO 7899-2 - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693352	100 ml Flasche B.E.A.-Agar (Galle Esculin-Azid-Agar) - ISO 7899-2 - ClearLine	10	AA -

B.E.A. - Galle Esculin Azid (Agar) ISO 10273

Für die Isolierung und Identifizierung von Enterokokken und die Untersuchung der Esculin-Fermentation durch Yersinia.



- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**
- **Zum Nachweis von Yersinia enterocolitica gemäß ISO 10273 : 30 °C für 24 h**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777189	Dehydriertes Medium für B.E.A.-Agar (Galle Esculin-Azid-Agar) - ISO 10273 - Condalab	500 g	AA -

B.L.B.V.B. - Leuchtend grüne Brühe 2%

Zum Nachweis von Coliformen in Wasser und Lebensmitteln.

- **Lagerung 2 - 8 °C**
- **Inkubation 30- 37 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777201	Dehydriertes Medium hellgrüne Brühe 2% - Condalab	500 g	AA -

Blutagar

Siehe Blutagar

EE-Brühe

Siehe Mossel Brühe

Herz- und Hirnbrühe

Siehe Herz-Hirn-Brühe

Eugon-Brühe LT100

Siehe eugon LT100

Hefe- und Schimmelpilzbrühe

Siehe Hefeschimmelbrühe

Gepufferte sLB-Brühe

Siehe sLB-Brühe

Terrific Brühe

Wird zusammen mit Glycerin für die Kultur von rekombinanten Stämmen von Escherichia coli verwendet. Für die Molekularbiologie.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 30 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777505	Terrific Brühe dehydriertes Medium - Condalab	500 g	AA -

Bryant Burkey mit Resazurin (Brühe)

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 37 ± 2 °C für 7 Tage**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777207	Bryant Burkey dehydriertes Brühe-Medium mit Resazurin - Condalab	500 g	AA -

Campylobacter (Agar) - ISO 10272 / ISO 11133

Zur Isolierung von Campylobacter jejuni, Campylobacter coli und Campylobacter laridis.

- **Lagerung: 8 - 25 °C**
- **Inkubation 41,5 °C in einer mikroaerobischen Atmosphäre für 44 ± 4 h**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777213	Dehydriertes Campylobacter-Agar-Medium - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

- **ISO 10272**
- **Zu rekonstituieren in 5 ml sterilem destilliertem Wasser**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777776	Zusatz zum Campylobacter-Agar - Condalab	10 Fläschchen für 500 ml	AA -

CCA (Chromogener Coliform-Agar)

Siehe E coli - coliform

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com