Cetrimid (Agar)

Für die Isolierung und präsumtive Identifizierung von Pseudomonas aeruginosa. Cetrimid ist ein quaternäres Ammonium, das das Wachstum der meisten anderen Bakterienarten hemmt. Pseudomonas aeruginosa färbt dieses Medium durch die Produktion von Pyocyanin blau-grün.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation : 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777217	Dehydriertes Ketrimid-Agar-Medium - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693319	100 ml Flasche Ketrimid-Agar - ClearLine	10	AA -

Chapman (Agar)

Wird zur Isolierung von pathogenen Staphylokokken verwendet, die durch Fermentation von Mannitol gelbe Kolonien bilden und sich in Phenolrot verwandeln. Sein hoher Natriumchloridgehalt hemmt das Wachstum der meisten anderen Arten.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777307	Dehydriertes Medium für Chapman-Agar - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
993988	100 ml Flasche Chapman - ClearLine® Agar	10	AA -
778495	100 ml Chapman-Agar-Flasche - Condalab	150	AA -
693444	200 ml Flasche Chapman - ClearLine® Agar	6	AA -

Chapman-Stone (Agar)




Für die Isolierung von Staphylokokken in Lebensmitteln. Es enthält Ammoniumsulfat zum Nachweis der Gelatinaseaktivität (Stone-Reaktion).

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 30 ± 2 °C für 18 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777218	Chapman-Steinagar-dehydriertes Medium - Condalab	500 g	AA -

E. coli - Coliform (chromogener Agar) - Chromogener Coliform-Agar (CCA)




Medium für den Nachweis von E.coli und coliformen Keimen in der Wasserwirtschaft gemäß ISO 9308 und ISO 11133.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 36 °C ± 2 °C für 21± 3 Stunden**

E.coli: dunkelblaue bis violette Kolonien
Gesamtcoliforme: lachsrote Kolonien + andere Kolonien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
778391	Chromogenes Agarmedium für den Nachweis von E. coli und Coliformen - Condalab	500 g	AA -

Chapman TTC (Laktoseagar mit Tergitol 7)



Für den Nachweis und die Auszählung von Escherichia coli und coliformen Keimen in Wasser durch die Membranfiltrationstechnik.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 36 ± 2 °C ± 4 °C für 21± 3 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777425	Dehydriertes Medium für Chapman TTC-Agar - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

- **1% iges TTC (wird in 5 ml sterilem destilliertem Wasser rekonstituiert)**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777802	Aufpreis inkl. MwSt. 1%	10 Fläschchen für 500 ml	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693327	100 ml Flasche Tergitol 7 Agar - ClearLine®	10	AA -

Hirnherz (Brühe) (Hirnherz-Infusion)

Reichhaltiges Medium für die Kultivierung von anspruchsvollen Keimen. Seine Verwendung wird für den Nachweis von Staphylococcus aureus in Lebensmitteln empfohlen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 35 °C- 37 °C für 24 - 48 Stunden**

Dehydrierte Basen

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777824	Dehydriertes Medium Hirn-Herzinfusionsbrühe ISO 6888/11133 - 500 g	500 g	AA -
777197	Dehydrierte Brühe aus Herz und Gehirn - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693353	100 ml Flasche Herz- und Hirnbrühe ISO 6888 - ClearLine	10	AA -

Hirnherz (Agar)

Reichhaltiges Medium für die Kultivierung von anspruchsvollen Keimen. Seine Verwendung wird für den Nachweis von Staphylococcus aureus in Lebensmitteln empfohlen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C, unter 5-10 % CO_2-Atmosphäre für 24 - 72 h**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777196	Dehydriertes Gehirn-Herz-Agar-Medium - Condalab	500 g	AA -

DG18

Siehe DG18-Agar