Anaerobes Agar

Für die Kultur von anaeroben Keimen, insbesondere Clostridium.

- **Lagerung 8 - 15 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777174	Dehydriertes anaerobes Agarmedium - Condalab	500 g	AA -

Baird-Parker-Agar

Siehe Baird-Parker-Agar

Campylobacter-Agar

Siehe Campylobacter

Cetrimid-Agar

Siehe Cetrimid-Agar

Chapman-Agar

Siehe Chapman-Agar

Chromogener Salmonellen-Agar

Siehe Chromogener Salmonellen-Agar

Gehirn-Herz-Agar

Siehe Gehirn-Herz Agar

Columbia-Agar

Siehe Columbia-Agar

DRBC-Agar

Siehe DRBC-Agar

DG18 Agar

Zum Nachweis und zur Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in trockene Produkte mit einem aw-Wert von ‹0,95.

- **Lagerung: 2 - 8 °C im Dunkeln**
- **Inkubation 25 °C für 5 Tage in einer feuchten aeroben Atmosphäre**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693356	DG18 Agar 100 ml Flasche - ClearLine®	10	AA -

Agar für die Isolierung von Actinomyceten (Actinomyceten-Isolierungsagar Glycerin)

Für die Isolierung und Kultivierung von Actinomyceten in Boden und Wasser.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 30 °C ± 2 °C für 72 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777816	Dehydriertes Agar-Medium zur Isolierung von Actinomyceten - Condalab	500 g	AA -

Acetat-Differenzialagar (Acetat-Differential-Agar)

Zur Unterscheidung von Shigella und Escherichia coli.

- **Lagerung 8 - 15 °C**
- **Inkubation bei 35 °C ± 2 °C für 7 Tage**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777169	Dehydriertes Medium Acetat-Differential-Agar Condalab	500 g	AA -

Middlebrook-Agar

Siehe Middlebrook-Agar

PCA-Agar

Siehe PCA

Blutagar

Zur Bestimmung von hämolytischen Keimen und zum Nachweis von Bacillus cereus und Listeria monocytogenes.

- **Lagerung 8 - 15 °C**
- **Inkubation bei 35 °C ± 2 °C für 18 - 48 h für Listeria monocytogen**
- **Inkubation bei 30°C für 24 Stunden für Bacillus cereus**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777823	Blutagar-dehydriertes Medium (ISO7932) - Condalab	500 g	AA -

Wilson Blair Agar

Siehe Wilson-Blair-Agar

Giolotti-Cantoni (Brühe)


Anreicherungsmedium für den Nachweis von Staphylococcus aureus in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 40 - 48 Stunden**
- **ISO 11133-Zertifizierung: 37 ± 1 °C für 24 ± 2 - 48 ± 2 Std.**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777257	Dehydrierte Brühe Medium Giolotti - Cantoni - Condalab	500 g	AA -
777258	Dehydrierte Brühe Medium Giolotti - Cantoni - ISO 11133 - Condalab	500 g	AA -

Hektoen (Agar)

Differenzialselektivmedium für enteropathogene Bakterien, insbesondere Salmonellen und Shigellen. Die Zusammensetzung des Mediums ermöglicht die Unterscheidung von Kolonien, die schnell einen der drei Zucker fermentieren (Verfärbung von blau nach lachsrot) und/oder H_2S produzieren (schwarze Mitte).



- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 37 ± 1 °C für 20 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777263	Dehydriertes Hektoen-Agar-Medium - Condalab	500 g	AA -

I.T.C. - Irgasan-Brühe Ticarcillin und Kaliumchlorat

Brühe zur Selektion und Anreicherung von Yersinia enterolitica.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 25 ± 1 °C für 44± 4 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777265	Dehydriertes Medium I.T.C.-Brühe - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

- **Zu rekonstituieren in 8 ml sterilem destilliertem Wasser**
- **Lagerung: 2 - 8 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777785	Zusatz für I.T.C. Brühe - Condalab	10 Flaschen für 500 ml	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com