sLB (Brühe)

Für das bakterielle Wachstum und führt zu hohen Ausbeuten an Plasmiden mit niedriger Kopienzahl. Wird in der Molekularbiologie verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 24; 48 und 72 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777502	Dehydriertes Medium für gepufferte sLB-Brühe - Condalab	500 g	AA -

Letheen (Brühe)

Wird in der kosmetischen Industrie verwendet, um die Wirkung von Konservierungsmitteln vor der mikrobiologischen Untersuchung zu neutralisieren oder um die bakterizide Wirkung von quaternären Ammoniumverbindungen zu bestimmen.

- **Lagerung 2 - 8 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693430	9-ml-Tube Letheen-Brühe - ClearLine®	100	AA -
693411	10 ml Röhrchen Letheen-Brühe - ClearLine®	100	AA -
693323	100 ml Flasche Letheen-Brühe - ClearLine®	10	AA -

Letheen Modifiziert (Brühe)

Wird verwendet, um die Wirkung von Konservierungsmitteln vor der mikrobiologischen Untersuchung zu neutralisieren.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (für dehydrierte Basis) und 2 - 8 °C (für gebrauchsfertige Medien)**


Dehydriertes Medium

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777284	Dehydriertes Medium für modifizierte Letheenbrühe - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693431	9-ml-Röhrchen mit modifizierter Letheen-Brühe - ClearLine®	100	AA -
693402	90-ml-Flasche mit modifizierter Letheen-Brühe - ClearLine®	10	AA -
693447	200-ml-Flasche mit modifizierter Letheen-Brühe - ClearLine®	6	AA -

Levine (Agar)




Escherichia coli

Medium mit geringer Selektivität für die Differenzierung von laktosepositiven und laktose-negativen Enterobacteriaceae in Lebensmitteln und Milchprodukten.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777285	Dehydriertes Levine-Agar-Medium (E.M.B.) - Condalab	500 g	AA -

Listeria (Agar)



Listeria innocua — Listeria monocytogenes

Medium für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777289	Dehydriertes Medium für Listeria chromogenic agar nach Ottaviani und Agosti (ALOA) - Condalab	500 g	AA -

Ergänzungen

Zu rekonstituieren in 5 ml einer Wasser/Aceton-Mischung (1/1).
Für 500 ml des Mediums.

- **1 Fläschchen mit Lipase-C-Substrat**
- **1 Flasche mit : 50 mg Cycloheximid + 10 mg Ceftazidim + 10 mg Nalidixinsäure + 38350 IU Polymyxin B**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777790	Lipase C Ergänzung - Condalab	10 Flaschen für 500 ml	AA -
777789	Cycloheximid + Polymexin-B-Sulfat + Ceftazimidim + Nalidixinsäure-Zusatz - Condalab	10 Flaschen für 500 ml	AA -

Lysin-Eisen (Agar)

Ermöglicht die Differenzierung von Salmonella arizonae durch Untersuchung der Lysindecarboxylierung.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777296	Dehydriertes Lysin-Eisen-Agar-Medium - Condalab	500 g	AA -

Lysindecarboxylase (Brühe) ISO 10273

Zur Identifizierung von Mikroorganismen, insbesondere von Darmbazillen, auf der Grundlage ihrer Fähigkeit zur Decarboxylierung von Lysin.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777294	Dehydriertes Medium Lysindecarboxylase-Brühe ISO 10273 - Condalab	500 g	AA -

Lysindecarboxylase (Brühe) ISO 6579

Zur biochemischen Bestätigung von Salmonella und Yersina enterocolitica.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 37 ± 2 °C für 24± 3 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777295	Dehydriertes Medium Lysin-Decarboxylase-Bouillon ISO 6579 - Condalab	500 g	AA -

M17 (Agar)

Für die Kultur und Auszählung von Milchstreptokokken in Milch und Milchprodukten.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 28- 30 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777297	Dehydriertes Agarmedium M17 - Condalab	500 g	AA -