## Rogosa SL (Brühe)

Für die Auswahl und Kultivierung von Laktobazillen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 48 Stunden**

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackt zu | CHF |
|---|---|---|---|
| 777361 | Rogosa SL Medium für dehydrierte Brühe - Condalab | 500 g | AA - |

## Rogosa SL (Agar)

Für die Auswahl und Kultivierung von Laktobazillen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 24 - 48 Stunden**

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackt zu | CHF |
|---|---|---|---|
| 777360 | Rogosa SL-Agar-Trockenmedium - Condalab | 500 g | AA - |

## Bengalrosa + Chloramphenicol (Agar)

Medium zur Kultivierung und Identifizierung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 25 - 30 °C für 7 Tage**

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackt zu | CHF |
|---|---|---|---|
| 777362 | Dehydriertes Medium Rose Bengal Agar + Chloramphenicol - Condalab | 500 g | AA - |

## Rose Bengal + Chloramphenicol + Dichloran ISO 11133 / ISO 21527 (DRBC - Agar)

Medium zur Kultivierung und Identifizierung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 25 ± 1 °C für 5 Tage**



Aspergillus brasiliensis

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackt zu | CHF |
|---|---|---|---|
| 777363 | Dehydriertes Medium Rose Bengal Agar + Chloramphenicol + Dichloran - Condalab | 500 g | AA - |
| 693360 | DRBC Agar 100 ml Flasche - ClearLine® | 10 | AA - |

## Rothe (Brühe)

Wird für die Auszählung von Fäkalenterokokken verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 24 - 48 Stunden**

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackt zu | CHF |
|---|---|---|---|
| 777364 | Dehydriertes Medium Rothe-Brühe (Glucose-Brühe mit Azid) - Condalab | 500 g | AA - |

## Glukosereiches Sabouraud (Brühe)

Wird für das Wachstum einer großen Vielfalt von Hefen und Schimmelpilzen verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 20 - 25 °C für 2 bis 5 Tage**

### Dehydrierte Basis

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackt zu | CHF |
|---|---|---|---|
| 777371 | Dehydriertes Medium Sabouraud-Glucose-Agar - Condalab | 500 g | AA - |

### Gebrauchsfertige Medien

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackt zu | CHF |
|---|---|---|---|
| 693416 | 10-ml-Röhrchen mit Sabouraud-Glukose-Brühe - ClearLine® | 100 | AA - |
| 693381 | 100-ml-Flasche mit glukosierter Sabouraud-Brühe - ClearLine® | 10 | AA - |

## Sabouraud-Glukose (Agar)

Wird für das Wachstum und die Isolierung einer großen Vielfalt von Hefen und Schimmelpilzen verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 20 - 25 °C für 2 bis 5 Tage**

### Dehydrierte Basis

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackt zu | CHF |
|---|---|---|---|
| 777366 | Dehydriertes Medium Sabouraud-Glucose-Agar - Condalab | 500 g | AA - |

### Gebrauchsfertige Medien

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackt zu | CHF |
|---|---|---|---|
| 693382 | 100 ml Flasche Sabouraud-Glucose-Agar - ClearLine® | 10 | AA - |
| 693450 | 200 ml Flasche Sabouraud-Glucose-Agar - ClearLine® | 6 | AA - |

## Sabouraud + Chloramphenicol (Agar)

Wird für das Wachstum und die Isolierung einer großen Vielfalt von Hefen und Schimmelpilzen verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 20 - 25 °C für 2 bis 5 Tage**

### Dehydrierte Basis

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackt zu | CHF |
|---|---|---|---|
| 777368 | Dehydriertes Medium glukosierter Sabouraud-Agar + Chloramphenicol - Condalab | 500 g | AA - |

### Gebrauchsfertige Medien

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackt zu | CHF |
|---|---|---|---|
| 693439 | Schrägagarröhrchen, Sabouraud, Glukose + Chloramphenicol - ClearLine® | 100 | AA - |
| 693383 | 100 ml Flasche Sabouraud-Agar Gukose + Chloramphenicol - ClearLine® | 10 | AA - |
| 693451 | 200 ml Flasche Sabouraud-Agar Gukose + Chloramphenicol - ClearLine® | 6 | AA - |

## Sabouraud + Chloramphenicol + Cycloheximid (Agar)

Wird für das Wachstum und die Isolierung einer großen Vielfalt von Hefen und Schimmelpilzen verwendet. Chloramphenicol hemmt das Wachstum von Bakterien. Cycloheximid hemmt das Wachstum von saprophytischen Pilzen, hat aber keine Wirkung auf pathogene Pilze.

- **Lagerung: 2 - 25°C (dehydrierte Basis) und 2 - 8°C (gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 30 °C für 2-5 Tage**

### Dehydrierte Basis

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackt zu | CHF |
|---|---|---|---|
| 777370 | Dehydriertes Medium glukosierter Sabouraud-Agar + Chloramphenicol + Cycloheximid - Condalab | 500 g | AA - |

### Gebrauchsfertige Medien

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackt zu | CHF |
|---|---|---|---|
| 693440 | Schrägagar Röhrchen Sabouraud Gukose + Chloramphenicol + Cycloheximid - ClearLine® | 100 | AA - |
| 693332 | 200 ml Flasche Sabouraud-Agar Glukose + Chloramphenicol + Cycloheximid - ClearLine® | 6 | AA - |

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com