TAT (Brühe)

Zum Nachweis einer bakteriellen Kontamination. Sojalecithin und Tween® 20 neutralisieren die Konservierungsstoffe.

- **Lagerung: 2 - 8 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
693403	90 ml Flasche TAT-Brühe + Tween®20 - ClearLine®	10	AA -

T.B.S. (Trypton-Gallensalz-Agar) ISO 9308-1

Für den Nachweis und die Auszählung von Escherichia coli und anderen coliformen Keimen in Wasser mittels Membranfiltrationstechnik.


- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation Die Membran wird zunächst bei 36°C für 2 - 4 Stunden auf TSA-Agar bebrütet und dann auf TBS-Agar übertragen, wo sie für 19 - 20 Stunden bei 44 ± 0,5°C bebrütet wird**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777414	Dehydriertes Agarmedium TBS - Condalab	500 g	AA -

T.B.X. (Trypton-Galle-x-Glucuronid - Chromogener Agar)

Zum Nachweis und zur Zählung von Escherichia coli in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis) und 2 - 8 °C in Abwesenheit von Licht (gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 44 ± 1 °C für 21± 3 Stunden**



Escherichia coli

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777398	Dehydriertes Agarmedium TBX - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693388	100 ml Flasche TBX-Agar - ClearLine®	10	AA -
693452	200 ml Flasche TBX-Agar - ClearLine®	6	AA -

TCBS

Zur Isolierung von Vibrio cholerea und parahaemolyticus sowie der meisten anderen enteropathogenen Vibrio-Arten, hauptsächlich aus Fisch und Meeresfrüchten.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777399	Dehydriertes Agarmedium TCBS - Condalab	500 g	AA -

Tergitol 7

Siehe Chapman TTC

Tetrathionat (Brühe)

Wird zur selektiven Anreicherung von Salmonellen in Lebensmitteln und Wasser verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777400	Dehydriertes Medium Tetrathionat-Brühe - Condalab	500 g	AA -

Ergänzungen

- **20 ml einer Jod-Jodid-Lösung (6 g Jod und 5 g Kaliumjodid in 20 ml Wasser) in 10 ml Medium geben**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
348454-CER	Jod	100 g	AA -
362405-CER	Kaliumjodid	250 g	AA -

Thioglykolat mit Resazurin (Brühe)

Dient zum Nachweis lebensfähiger aerober, mikroaerober und anaerober Mikroorganismen in normalerweise sterilen Produkten.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 30 - 35 °C für 3 Tage**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777402	Dehydratisiertes Medium Thioglykolat flüssiges Medium mit Resazurin - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693418	10-ml-Röhrchen Thioglykolat Brühe mit Resazurin - ClearLine®	100	AA -
693389	100 ml Flasche Thioglykolat Brühe mit Resazurin - ClearLine®	10	AA -

Trypton-Soja-Agar

Für den Nachweis und die Auszählung von Escherichia coli und anderen coliformen Keimen in Wasser mit Hilfe der Membranfiltrationstechnik nach ISO 9308-1.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 36 ± 2 °C für 21± 3 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777415	Trypticasein-Soja-Agar (TSA) - Condalab	500 g	AA -

T.S.A. (Trypticasein-Soja-Agar) (Agar)

Ein Allzweckmedium für das Wachstum und die Isolierung einer großen Vielfalt von Mikroorganismen. Es kann mit 5-7 % Blut ergänzt werden, um hämolytische Reaktionen festzustellen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis) und 2 - 8 °C (gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777410	Trypticasein-Soja-Agar (TSA) - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693390	Trypticase-Soja-Agar (TSA) 100 ml Flasche - ClearLine®	10	AA -
693455	Trypticase-Soja-Agar (TSA) 200 ml Flasche - ClearLine®	6	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com