T.S.B. (Trypticasein-Soja Brühe)

Ein Allzweckmedium für das Wachstum und die Isolierung einer großen Vielfalt von Mikroorganismen. Es wird in der europäischen und amerikanischen Pharmakopöe empfohlen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (Dehydrierte Basis und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 30 ± 1 °C für 48± 4 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777413	Trypticasein-Soja-Brühe (TSB) - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
693419	Tryptische Soja Brühe (TSB) 10 ml Röhrchen - ClearLine®	100	AA -
693404	Tryptische Soja Brühe (TSB) - ClearLine® 100 ml Flasche	10	AA -
693454	Tryptische Soja Brühe (TSB) - ClearLine® 200 ml Flasche	6	AA -

T.S.C. (Tryptose-Sulfit-Cycloserin-Agar)

Empfohlen für den Nachweis und die Zählung von Clostridium perfringens und sulfitreduzierenden Anaerobiern in Wasser und Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis) und 2 - 8 °C (gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 37 °C für 20 h**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777424	Dehydriertes Medium T.S.C. - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

Für 500 ml Medium

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777524	Anhang D - Cycloserin für T.S.C.-Agar - Condalab	10 Flaschen für 500 ml	AA -

T.S.I. (Triple Sugar Iron-Agar) ISO 19250



Wird zur präsumtiven Identifizierung von Enterobacteriaceae auf der Grundlage der Fermentation von Glucose, Lactose, Saccharose und der Produktion von Gas und H_2S verwendet. Seine Verwendung wird für den Nachweis von Salmonellen in Arzneimitteln und für den Nachweis von Salmonellen und Campylobacter in Lebensmitteln empfohlen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 36 ± 2 °C für 24± 3 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777407	Dehydriertes Agarmedium T.S.I. - Condalab	500 g	AA -

T.S.N. (Tryptonsulfit mit Neomycin)

Empfohlen für den Nachweis und die Auszählung von Clostridium perfringens und sulfitreduzierenden Anaerobiern in bestimmte Lebensmittel.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis) und 2 - 8 °C (gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 48 ± 1 °C für 18 - 24 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777416	Dehydriertes Agarmedium T.S.N. - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693420	20-ml-Röhrchen mit T.S.N.-Agar - ClearLine®	100	AA -

Trypton

Wird als Stickstoffquelle verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777472	Trypton - Condalab	500 g	AA -

Tryptonsalz

Siehe Peptonsalz Seite 649

Tryptose-Sulfit

Zum Nachweis von Clostridium perfringens.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 37 ± 1 °C für 20 ± 4; 44 ± 4 Std.**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777422	Trypton-Sulfit-Agar-Trockenmedium - Condalab	500 g	AA -

T.S.Y.E.A. Agar (Trypton-Soja-Hefeextrakt-Agar)

Zur Bestätigung von Listeria spp

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 37 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777416	Dehydriertes Medium für T.S.Y.E.A.-Agar - Condalab	500 g	AA -

T.S.Y.E.B. (Tryptone Soja Brühe Hefeextrakt)

Zur Bestätigung von Listeria monocytogenes.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 25 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777417	Dehydriertes Medium für T.S.Y.E.B-Brühe - Condalab	500 g	AA -

U.B.A. (Universal-Beer-Agar) (Agar)

Für die Kultivierung von wichtigen Bakterien in der Bierindustrie.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 28 - 30 °C für 3 Tage**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777888	Dehydriertes Medium für U.B.A.-Agar - Condalab	500 g	AA -