X.L.D. (Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar) ISO 6579

Selektives Medium für Enterobacteriaceae und insbesondere für Salmonella und Shigella. Es ermöglicht eine Orientierung bei der Identifizierung von Enterobakterien anhand von 3 Kriterien: Fermentation von Zuckern, Decarboxylierung von Lysin und Produktion von H_2S.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 37 °C für 24± 3 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777440	Dehydriertes Agarmedium X.L.D. - Condalab	500 g	AA -

X.L.D. (Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar) Europäische Pharmakopöe / USP



Salmonella typhimurium

Selektives Medium für Enterobacteriaceae und insbesondere für Salmonella und Shigella. Es ermöglicht eine Orientierung bei der Identifizierung von Enterobakterien anhand von 3 Kriterien: Fermentation von Zuckern, Decarboxylierung von Lysin und Produktion von H_2S. Seine Verwendung wird in den europäischen und amerikanischen Pharmakopöen empfohlen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydrierte Basis) und 2 - 8 °C vor Licht geschützt (gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 30- 35 °C für 18 - 48 Stunden**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777441	Dehydriertes Agarmedium X.L.D. - Condalab	500 g	AA -

XLT 4 (Agar)

Verbessert den Nachweis von Nicht-Typhi-Salmonellen in Hühnerfleischproben und Proben aus der Umgebung des landwirtschaftlichen Betriebs erheblich.

- **Lagerung: 2 - 25°C (dehydrierte Basis)**
- **Inkubation 30 ± 2 °C für 18 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777442	Dehydriertes Agarmedium XLT4 - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

Für 1000 ml Medium

- **4,60 ml 7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol-Lösung (Tergitol 4®)**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
777806	Zusatz für XLT4-Agar	100 ml	AA -

Hefeextrakt (Hefe-Agar-Extrakt)

Zur Selektion und Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in Milch und Milchprodukten.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 28 °C für 7 Tage**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777444	Hefeextrakt-Agar-dehydriertes Medium - Condalab	500 g	AA -


Yeast Mold (Brühe)

Für die Kultivierung von Hefen und Schimmelpilzen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 30°C ± 2°C für 18- 72 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777898	Dehydriertes Medium für Hefen und Schimmelpilze - Condalab	500 g	AA -

Yersinia (Selektivagar) ISO 10273



Yersinia enterocolitica

Selektives Medium für Yersinia enterocolitica.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 30 °C für 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777446	Dehydriertes Medium für Yersinia Selektivagar - Condalab	500 g	AA -

Y.G.C. (Hefe-Glucose-Chloramphenicol-Brühe)

Für die Auswahl und Auszählung von Hefen und Schimmelpilzen in Milch und Milcherzeugnissen nach der MPN-Methode.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 25 - 30°C für 3 - 5 Tage**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777260	Hefe-Glucose-Chloramphenicol-Medium in dehydrierter Brühe - Condalab	500 g	AA -

Y.G.C. (Hefe-Glucose-Chloramphenicol-Agar oder Chloramphenicol-Glucose-Agar C.G.A.) ISO 6611

Empfohlen für die Auszählung von Hefen und Schimmelpilzen in Milch und Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydratisierte Basis) und 2 - 8 °C (dehydratisiertes Medium)**
- **Inkubation 25 °C für 5 Tage**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777219	Dehydriertes Hefe-Glucose-Chloramphenicol-Agar-Medium - Condalab	500 g	AA -

YPD (Agar)

Für die Entwicklung von Hefen in molekularbiologischen Verfahren, z. B. Saccharomyces cerevisiae.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 25 ± 2 °C für 42 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777514	Dehydriertes Agarmedium YPD - Condalab	500 g	AA -

YPD (Brühe)

Für die Entwicklung von Hefen in molekularbiologischen Verfahren, z. B. Saccharomyces cerevisiae.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 25 ± 2 °C für 42 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777515	Dehydriertes Medium YPD Brühe Condalab	500 g	AA -