Flacons de culture cellulaire standard ClearLine®



- Flacons en polystyrène cristal
- Empilage facile
- Emballés en sachets pelables
- Certificats disponibles sur demande
- Impression du n° de lot et de la date d'expiration sur chaque flacon
- Modèle avec bouchon filtre: à membrane hydrophobe, empêche le passage des bactéries et des spores et des particules supérieures à 0,2 µm

Unsere Ausnahl · Unsere Auswahl · DNase RNase · Endo-toxines

Référence	Type de col	Type de bouchon	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Surface 25 cm²						
131000C	Incliné	Standard	TC	10	200	NC -
131006C	Incliné	Filtrant	TC	10	200	NC -
Surface 75 cm²						
131002C	Incliné	Standard	TC	5	100	NC -
131008C	Incliné	Filtrant	TC	5	100	NC -
Surface 175 cm²						
131004C	Incliné	Standard	TC	5	40	NC -
131010C	Incliné	Filtrant	TC	5	40	NC -

Flacons de culture cellulaire Merck Millipore® Millicell® HY FLASK




- Flacons traités culture multi-plateaux
- Rendements et viabilité constants
- Conditions de culture uniformes
- Bouchon à membrane filtrante placé sur le haut du flacon pour faciliter le pipetage, le remplissage et l'aspiration
- Disponibles en 3 plateaux (600 cm²) ou en 5 plateaux (1000 cm²)

Référence	Surface en cm²	Type de bouchon	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
051996	600	Filtrant	TC	2	16	NC -
051997	1000	Filtrant	TC	1	8	NC -

Boîtes de Petri

Boîtes de Petri traitées culture cellulaire Falcon®



Surface de culture parfaitement plane, sans distorsion et optiquement claire.

- Rebord d'empilement, située au-dessus du couvercle facilite la manipulation et le stockage
- Le système Easy Grip™ permet une meilleure préhension
- Le couvercle, avec un rebord très couvrant, permet de réduire les risques de contamination
- Spécialement conçues pour permettre des échanges gazeux optimum grâce à 3 ergots situés à l'intérieur du couvercle

Corning Primaria®

- Traitement de surface favorisant l'attachement et la prolifération de types cellulaires difficiles à cultiver sur un support de culture traditionnel. Le traitement de surface est stable dans le temps et homogène, tout particulièrement adapté aux cellules neuronales, endothéliales ou tumorales

PureCoat™ Amine

- Adapté aux cellules qui démontrent une faible attachement, cette surface favorise l'adhésion, la prolifération et la différenciation d'un grand nombre de cellules : cellules primaires neuronales, cellules transfectées (ex : HEK-293) ou de lignées cellulaires comme PC12, HepG2
- Alternative aux coatings biologiques - surface animal-free
- Surface stable 18 mois à partir de la date de fabrication

PureCoat™ Carboxyl

- Adapté aux cellules qui démontrent une faible attachement, cette surface favorise l'adhésion, la prolifération et la différenciation d'un grand nombre de cellules : cardiomyocytes (rat,souris), kératinocytes (rat), PC12, HT-1080, MCR-5
- Alternative aux coatings biologiques - surface animal-free
- Surface stable 18 mois à partir de la date de fabrication

Référence	Ø int x h int. (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	CHF/ carton
Ø 35 mm						
353001	35,61 x 9,56	Easy Grip™	TC	20	500	NC -
353801	35,61 x 9,56	-	Primaria®	20	200	NC -
Ø 60 mm						
353004	50,47 x 11,17	Easy Grip™	TC	20	500	NC -
353802	50,47 x 11,17	-	Primaria®	20	200	NC -
Ø 100 mm						
353003	89,43 x 19,18	-	TC	20	200	NC -
353803	89,43 x 19,18	-	Primaria®	20	200	NC -
354732	89,43 x 19,18	-	Purecoat™ Amine	10	10	NC -
354784	89,43 x 19,18	-	Purecoat™ Carboxyl	10	10	NC -
Ø 150 mm						
353025	142,57 x 24,77	Fond quadrillé	TC	10	100	NC -

Autres conditionnements : nous consulter

