Gamme Himedia (suite)

NOUVEAU

Agents gelifiants en poudre

Désignation	CleriGar™	CleriGel™ Ultra	CleriGel™ Super
Référence	490656	490657	490658
Apparence	Poudre fluide homogène blanche à blanc cassé		
Solubilité	Claire à légèrement trouble à 0,5g dans 100 ml d'eau après ébullition	Claire à légèrement trouble à 0,2 g dans 100 ml d'eau après ébullition	Claire à légèrement trouble à 0,2 g dans 100 ml d'eau après ébullition
Clarté	Gel transparent formé lors du refroidissement		
Perte au séchage	≤ 20%	≤ 15%	≤ 15%
Transmission	-	≥ 80%	≥ 80%
Pouvoir gélifiant	-	500 - 700 g/cm^2	400 - 700 g/cm^2
Utilisation	3 - 5 g/l	2 - 2,5 g/l	1,8 - 2,5 g/l

Référence	Désignation	Vol. (g)	CHF
490654	Agar en poudre	500	NC -
490655	Carraghénane	500	NC -
490656	CleriGar	500	NC -
490657	CleriGel Ultra	100	NC -
490658	CleriGel Super	100	NC -

Régulateurs de croissance

Favorisent la division cellulaire, croissance cellulaire, la floraison, la fructification et la formation de graines.

Auxines

L'auxine favorise la croissance des racines.

Réf.	Désignation	Vol.	CHF
490659	Acide 2,4-Dichlorophenoxyacetique (2,4-D)	100 g	NC -
490660	Acide indole- 3 -acetique (IAA)	5 mg	NC -
490661	Acide indole -3- butyrique (IBA)	5 g	NC -
490662	Acide Acetique A-Naphthalene (NAA)	25 g	NC -

Cytokinines

Stimule la croissance de bourgeon.

Réf.	Désignation	Vol.	CHF
490663	Adenine Sulphate	10 g	NC -
490664	6-Benzyladenine (6-BAP)	1 g	NC -
490665	N6-(2-Isopenteyl) Adenine	1 g	NC -
490666	Kinetine	1 g	NC -
490667	Thidiazuron (TDZ)	1 g	NC -
490668	Meta-Topoline	25 mg	NC -
490669	Zeatine	50 mg	NC -

Gibbérellines

Régulent divers processus de développement, notamment l'allongement des tiges, la germination, la dormance, la floraison, le développement des fleurs et la sénescence des feuilles et des fruits.

Référence	Désignation	Vol.	CHF
490670	Acide gibbérellique (GA3)	1 g	NC -

Autres

Réf.	Désignation	Vol.	CHF
490671	Acide Abscissique: Inhibiteur De Croissance	100 mg	NC -
490672	Maleic Hydrazide	100 g	NC -
490673	Phloroglucinol	25 g	NC -
490674	Piclorame	5 g	NC -
490675	Dihydrochlorure De Putrescine	1 g	NC -
490676	Spermidine	1 g	NC -
490677	Acide 2,4,5 Trichlorophenoxyacetique	25 g	NC -

Antibiotiques - Antimicrobiens

Antibiotiques antifongiques

Réf.	Désignation	Vol.	CHF
490678	Amoxycilline	10 g	NC -
490682	Amoxycilline/Acide Clavulanic (Augmentin)	2 g	NC -
490680	Amphotericine B	10 g	NC -
490681	Carbendazim	5 g	NC -
490679	Carbenicilline Disodium	10 g	NC -
490683	Colistin Sulphate	1 g	NC -
490684	Kanamycin Sulphate Acide	25 g	NC -
490686	Miconazole Nitrate	25 g	NC -
490688	Ribavirine	10 mg	NC -
490687	Rifampicine	25 g	NC -
490689	Streptomycine Sulphate	100 g	NC -
490685	Timentin	2 g	NC -

Supplément antimicrobien - désinfectant

Réf.	Désignation	Vol.	CHF
490690	Supplément antimicrobien	50 ml	NC -
490691	Calcium hypochlorite	500 g	NC -
490692	Peroxyde d'hydrogène	100 ml	NC -
490693	Nitrate d'argent	10 g	NC -
490694	Tween 20®	500 ml	NC -



Autres antibiotiques sur demande

Eléments chimiques

Acides aminés

La glycine sert de source d'acides aminés
Autres acides aminés nous consulter.

Référence	Désignation	Vol.	CHF
490695	Glycine	500 g	NC -

Tampons

Référence	Désignation	Vol.	CHF
490696	Tampon MES	25 g	NC -

Enzymes

Les protoplastes sont des cellules végétales nues sphériques produites par l'élimination de la paroi cellulaire au moyen d'enzymes digestives. Les protoplastes végétaux peuvent être cultivés dans des milieux définis et formeront une nouvelle paroi cellulaire, se diviseront et, dans de nombreux cas, régénéreront des plantes complètes.

La méthode enzymatique est une technique très largement utilisée pour l'isolement des protoplastes.
Les avantages de la méthode enzymatique comprennent un bon rendement de cellules viables et des dommages minimes ou nuls aux protoplastes.

Réf.	Désignation	Vol.	CHF
490697	Cellulase	5 ku	NC -
490698	Macerozyme	1 g	NC -
490699	Pectinase	5 ku	NC -
490700	Pectolyase	25 ml	NC -