Tampon de charge,glycérol et bleu

Tampons de charge ADN 6x

Référence	Désignation	CHF
755124	Tampon de charge ADN 6x bleu, pour gel d'agarose et de polyacrylamide, 1 ml	NC -
755125	Tampon de charge ADN 6x bleu, pour gel d'agarose et de polyacrylamide, 10 ml	NC -
755130	Tampon de charge ADN 6x double bleu pour gel d'agarose et de polyacrylamide, 1 ml	NC -
755131	Tampon de charge ADN 6x double bleu pour gel d'agarose et de polyacrylamide, 10 ml	NC -
755108	Tampon de charge ADN 6x orange bleu, 1 ml	NC -
755109	Tampon de charge ADN 6x orange bleu, 10 ml	NC -
755132	Tampon de charge ADN 6x orange pour gel d'agarose et de polyacrylamide, 1 ml	NC -
755133	Tampon de charge ADN 6x orange pour gel d'agarose et de polyacrylamide, 10 ml	NC -

- Quatre tampons de charge colorés
- Enhancer pour matrices riches en GC
- $MgCl_2$

Colorant EmeralDye ClearLine®

Sensibilité élevée pour les petits fragments, bruit de fond atténué, colorant à ajouter lors de la préparation du gel ou suite à la migration, 4 - 6 µl pour 100 ml d'agarose.



- Pour le marquage d'acides nucléiques
- Alternative non carcinogène au bromure d'éthidium
- Solution de stockage sans DMSO
- Longueur d'onde d'excitation principale 490 nm / secondaire 290 nm
- Longueur d'onde d'émission 530 nm

Référence	Désignation	CHF
755110CL	EmeralDye 1 ml	NC -



DNA-dye NonTox

- Alternative non dangereuse, non mutagénique et non toxique au bromure d'éthidium
- Tampon de charge 6X prêt-à-l'emploi à mélanger directement avec les échantillons
- Contient 3 colorants de migration : bleu de bromophénol, xylène cyanol et orange G
- Excitable par les UV et par la lumière bleue
- Spectre excitation/émission : 495 (pic 1), 260 (pic 2) nm / 540 nm

Réf.	Désignation	Vol. (ml)	CHF
348693	DNA-dye NonTox	1	NC -

Colorant d'ADN pour gel DNAzure blue

- Colorant visible à l'œil nu après 5 à 30 min. d'exposition à la lumière
- Ultrasensible, visualisation de bandes jusqu'à 1 ng d'ADN
- Excision des bandes d'intérêts sans utilisation de lampe UV
- Colorant compatible avec une utilisation postérieure de l'ADN pour séquençage et clonage
- L'usage du bleu de bromophénol (présent dans certains tampons de charge) est déconseillé, il est préférable d'utiliser l'orange G
- Prise de photo possible sans imageur

Référence	Désignation	CHF
461094	Colorant pour gel DNAzure blue nucleic acid 100 X, 10 ml	NC -



Glycérol stérile

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
091535	Glycérol stérile	250 ml	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com