
Patch de coloration au bromure d'éthidium



- **Rapide et simple**
- **Evite la dispersion du bromure d'éthidium, idéal pour les TP**
- **Dépôt du patch sur le gel et attente : 8 - 10 min. pour les gels d'agarose 1 % et sup. ; 3 - 5 min. pour les gels d'agarose 0,8 %**
- **Feuillet de 7 x 7 cm mais livrés en feuillets joints pour des gels dimensionnés en multiples de 7 cm**

Référence	Désignation	CHF
994800	40 feuillets 7 x 7 cm	**NC -**
994801	100 feuillets 7 x 7 cm	**NC -**

Tampon absorbant au charbon actif pour colorants fluorescents



- **Tampon absorbant au charbon actif pour l'élimination rapide des colorants fluorescents tels que le bromure d'éthidium, le GelGreen et le GelRed, ainsi que le Sybr Safe**
- **Capacité maximale d'absorption : 10 mg de bromure d'éthidium**
- **Absorption des colorants en seulement 4 h sous agitation constante**

Réf.	Désignation	CHF les 25
461151	Tampon absorbant pour colorants fluorescents	**NC -**

Agarose basique

- **S'utilise pour la séparation de fragments d'ADN et d'ARN à des concentrations allant de 0,8 à 2 %**

PanReac AppliChem ITW Reagents

Référence	Désignation	CHF
348376	Agarose 500 g	**NC -**

Agarose

Réf.	Type	Applications	Flacon	CHF
4905008	Temp.fusion élevée/ rés.moy.	Standard sur l'ADN	25 g	**NC -**
4905009	Temp. fusion élevée/ rés. moy.	Standard sur l'ADN	500 g	**NC -**

