Tampon pour électrophorèse de protéines et blotting

Tampon en poudre ClearLine® pour électrophorèse d'acides nucléiques

ClearLine

Rapide et simple d'utilisation.

- **1 sachet permet de réaliser 1 litre de tampon 1X**
- **Aucun ajustement du pH nécessaire**
- **Tampon Fast running pour les électrophorèses à haute tension (300 - 350 V) ; permet la séparation rapide de fragments de moins de 5 kb (un cycle classique 30 min peut être réalisé en seulement 10 min)**

Référence	Désignation	Composition	pH	Unités/ carton	CHF/ carton
257081	Tampon TAE (Tris-Acetate-EDTA)	40 mM Tris, 20 mM acetic acid, 1 mM EDTA	8,2 - 8,4	100	NC -
257082	Tampon TBE (Tris-borate-EDTA)	89 mM Tris, 89 mM boric acid, 2 mM EDTA	8,2 - 8,5	50	NC -
257083	Tampon Fast running	-	8,1-8,5	100	NC -



NOUVEAU

Note sélection

Tampon électrophorèse d'acide nucléiques

Tampons d'électrophorèse en solution

Référence	Désignation	CHF
348604	TAE 10X, grade BM, 1 l	NC -
348603	TAE 10X, grade BM, 5 l	NC -
348605	TAE 50X, grade BM, 1 l	NC -
091582	TBE 10X, grade BM, 500 ml	NC -
348613	TBE 10X, grade BM, 1 l	NC -
348615	TBE 10X, grade BM, 5 l	NC -

Tampons de conservation en solution

Référence	Désignation	CHF
348619	TE 1X pH 8.0, grade BM, 500 ml	NC -
091576B	TE 1X pH 8.0, grade BM, 1 l	NC -
348618	TE 1X pH 8.0 low EDTA, grade BM, 500 ml	NC -
348617	TE 1X pH 8.0 low EDTA, grade BM, 1 l	NC -

Tampon d'hybridation

Référence	Désignation	CHF
091568B	SSC 20X, grade BM, 1 l	NC -

Tampon de lavage

Référence	Désignation	CHF
702678	TBS 10X pH 7.4, grade BM, 6 x 1 l	NC -

Tampons lyophilisés

Référence	Désignation	CHF
4905001	TBE 10X pour préparation de 10 l	NC -
4905005	SSC 10X pour préparation de 10 l	NC -

Tampons

Tampons TAE concentré

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
348603	TAE 10 x BM	5 l	NC -
348605	TAE 50 x BM	1 l	NC -

Le tampon TAE (Tris-Acétate-EDTA) est employé dans l'électrophorèse de gel d'agarose pour des applications exigeant une haute résolution et une séparation, sous une tension basse d'un poids moléculaire poids élevé, d'ADN bicaténaire. Les solutions sont aseptiquement microfiltrées.

Tampons TBE concentrés

Référence	Désignation	Conditionnement	CHF
523253	TBE 10 x BM	500 ml	NC -
348613	TBE 10 x BM	1 l	NC -

Tampon TBE concentré x 10
Pour la biologie moléculaire. Tampon d'électrophorèse.

Sachet de tampon en poudre

Pour un gain de place maximal. A dissoudre dans de l'eau pure pour obtenir la concentration finale indiquée.

Référence	Tampon (poudre)	Quantité finale	Composition	CHF le sachet
4905001	TBE 10 x	Un sachet pour 10 litres de concentration 1 x	1 x contenu : 89 mM Tris, 89 mM borate, 1 mM EDTA, pH 8,2 - 8,4	NC -
4905005	SSC 10 x	Un sachet pour 10 litres de concentration 1 x	1 x contenu : 150 mM NaCl, 15 mM sodium citrate, pH 7,8 - 8,1	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com