Columbia (gélose)

Pour la recherche de germes à croissance lente. Peut être utilisée avec ou sans addition de sang.

➤ **Stockage : 2 - 25 °C (milieu déshydraté et milieu prêt à l'emploi)**

➤ **Incubation : 35 °C ± 2 °C, sous atmosphère 5-10 % CO_2 pendant 48 h**

Base déshydratée

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777223	Milieu déshydraté Columbia conforme USP / ISO 10272 / ISO 11133 / Pharmacopée européenne - Condalab	500 g	NC -

Suppléments

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777795	Supplément sélectif pour isolation des Neisseria et Haemophilus - Condalab	5 x 2 flacons	NC -
777528	Supplément sélectif VCN (Vancomycine/Colistine/Nystatin) pour isolation Neisseria spp - Condalab	10 flacons	NC -
777804	Supplément sélectif VCNT (Vancomycine/Colistine/Nystatin/Trimethoprim) pour isolation Neisseria - Condalab	10 flacons	NC -
777803	Supplément sélectif VCAT (Vancomycine/Colistine/Namphotericin/Trimethoprim) pour isolation Neisseria - Condalab	10 flacons	NC -
777778	Supplément sélectif CNA (Colistin/Acide nalidixique) pourl'isolation de staphylococci, streptococci et penumococci - Condalab	10 flacons	NC -
777769B	Supplément sélectif pour l'isolation de Brucella spp - Condalab	30 flacons	NC -

Milieu prêt à l'emploi

Référence	Désignation	Cond.	CHF
693354	Gélose Columbia - ClearLine® - Flacon 100 ml	10	NC -

Dénombrement D/E (Dey-Engley) neutralisant (bouillon)

Utilisé pour la détermination des antiseptiques et des désinfectants.

➤ **Stockage : 2 - 8 °C**

➤ **Incubation : 37 °C pendant 48 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
693397	Flacon 90 ml bouillon dénombrement D/E neutralisant - ClearLine®	10	NC -
693355	Flacon 100 ml bouillon dénombrement D/E neutralisant - ClearLine®	10	NC -

Diluant pH 7

Utilisé pour la recherche de flore multiple.

➤ **Stockage : 2 - 25 °C**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
693426	Tube 9 ml diluant pH 7 - ClearLine®	100	NC -

Diluant pH 7 avec neutralisant

Utilisé pour la recherche de flore multiple.

➤ **Stockage : 2 - 25 °C**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
693427	Tube 9 ml diluant pH 7 avec neutralisant - ClearLine®	100	NC -
693446	Flacon 200 ml diluant pH 7 avec neutralisant - ClearLine®	6	NC -
693442	Flacon 300 ml diluant pH 7 avec neutralisant - ClearLine®	4	NC -

Diluant pH 7 avec Tween 80 (1 %)

Utilisé pour la recherche de flore multiple. L'addition de Tween 80 permet une neutralisation et une meilleure homogénéisation de certaines préparations.

➤ **Stockage : 2 - 25 °C**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
693309	Tube 9 ml diluant pH 7 avec Tween 80 (1 %) - ClearLine®	100	NC -
693398	Flacon 90 ml diluant pH 7 avec Tween 80 (1 %) - ClearLine®	10	NC -
693359	Flacon 100 ml diluant pH 7 avec Tween 80 (1 %) - ClearLine®	10	NC -

DRBC (Gélose) - Dichloran Rose Bengale Chloramphénicol

Recommandé pour la recherche et la numération des levures et moisissures dans les produits destinés à l'alimentation animale ou humaine dont l'aw est › 0,95.

➤ **Stockage : 2 - 8 °C**

➤ **Incubation : 25 °C pendant 2 à 5 jours**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
693360	Flacon 100 ml gélose DRBC - ClearLine®	10	NC -

Désoxycholate (gélose)

Pour l'isolement et la différenciation des bacilles entériques Gram (-).

➤ **Stockage 8 - 15 °C**

➤ **Incubation : 35 °C ± 2°C pendant 18 - 24 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777231	Milieu déshydraté gélose désoxycholate - Condalab	500 g	NC -

Désoxycholate Lactose (gélose)

Pour la différentiation et l'isolation des entérobactéries gram négatifs.

➤ **Stockage 8 - 15 °C**

➤ **Incubation : 35 °C ± 2°C pendant 18 - 24 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777233	Milieu déshydraté gélose désoxycholate lactose - Condalab	500 g	NC -

D.C.L.S. (gélose désoxycholate citrate lactose saccharose)

Milieu sélectif des entérobactéries, salmonelles et shigelles.

➤ **Stockage 8 - 15 °C**

➤ **Incubation : 37 °C pendant 24 et 48 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777230	Milieu déshydraté gélose désoxycholate citrate lactose saccharose (D.C.L.S.) - Condalab	500 g	NC -

Dextrose (gélose)

Pour la différentiation et l'isolation des entérobactéries gram négatifs.

➤ **Stockage 8 - 15 °C**

➤ **Incubation : 35 °C ± 2°C pendant 18 - 24 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777234	Milieu déshydraté gélose dextrose - Condalab	500 g	NC -

D.R.C.M. - bouillon différentiel renforcé Clostridium

Milieu non sélectif pour la numération des Clostridium par la méthode du MPN dans les eaux et les aliments.

➤ **Stockage : 2 - 25 °C**

➤ **Incubation : 30 °C pendant 4 - 7 jours**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777835	Milieu déshydraté pour bouillon différentiel renforcé Clostridium - Condalab	500 g	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com