ESTY (bouillon)

Pour l'isolation et la numération de streptocoques lactiques dans les yaourts et les produits laitiers.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 24 - 48 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777247	Milieu déshydraté pour bouillon ESTY - Condalab	500 g	NC -

ESTY (gélose)

Pour la numération des streptocoques thermophilus dans les yaourts.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 24 - 48 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777248	Milieu déshydraté pour gélose ESTY - Condalab	500 g	NC -

Eugon LT100 (bouillon)

Pour l'enrichissement des micro-organismes. Recommandé pour le dénombrement des bactéries aérobies mésophiles, la recherche des levures et des moisissures et de Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

- **Stockage : 2 - 25 °C (Milieu déshydraté et milieu prêt à l'emploi)**
- **Incubation : 30 - 35 °C pendant 24 à 72 h**

Milieu déshydraté

Référence	Désignation	Cond.	CHF
778403	Milieu déshydraté pour bouillon eugon LT100 - Condalab	500 g	NC -

Milieux prêts à l'emploi

Référence	Désignation	Cond.	CHF
693300	Tube 9 ml bouillon eugon LT100 - ClearLine®	100	NC -
693401	Flacon 90 ml bouillon eugon LT100 - ClearLine®	10	NC -

Ewing malonate (bouillon)

Pour la différenciation des coliformes.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 48 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777251	Milieu déshydraté pour bouillon Ewing malonate modifié - Condalab	500 g	NC -

Extrait de levure (yeast extract)

Ingrédient utilisé comme source d'azote dans les milieux.

- **Stockage : 2 - 25 °C**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777474	Extrait de levure - Condalab	500 g	NC -

Extrait de malt (malt extract)

Ingrédient utilisé comme source d'azote dans les milieux.

- **Stockage : 10 - 35 °C**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777462	Extrait de malt - Condalab	500 g	NC -

Fraser

Utilisé pour la détection et l'énumération des Listeria dans les produits alimentaires.

- **Stockage : 2 - 25 °C (pour la base) et 2 - 8 °C (pour le milieu prêt à l'emploi)**
- **Incubation : 30°C ± 1°C pendant 24 heures ± 2 heures**

Milieu déshydraté

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777547	Milieu déshydraté bouillon Fraser - conforme ISO 11133 / ISO 11290 - Condalab	500 g	NC -

Supplément

- **Citrate d'ammonium ferrique. A reconstituer dans 5 ml d'eau distillée stérile chaude**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777782	Supplément citrate d'ammonium ferrique - Condalab	10 flacons	NC -

Milieu prêt à l'emploi

Référence	Désignation	Cond.	CHF
693409	Tube 10 ml bouillon Fraser conforme ISO 11290-1 - ClearLine®	100	NC -

Fraser demi

Utilisé pour la détection et l'énumération des Listeria dans les produits alimentaires.

- **Stockage : 2 - 25 °C (pour la base) et 2 - 8 °C (pour le milieu prêt à l'emploi)**
- **Incubation (selon norme 11290) : 30 °C pendant 25 heures ± 1 heures**

Milieu déshydraté

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777852	Milieu déshydraté bouillon Fraser demi - conforme ISO 11133 / ISO 11290 - Condalab	500 g	NC -

Supplément

- **Citrate d'ammonium ferrique. A reconstituer dans 5 ml d'eau distillée stérile chaude**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777782	Supplément citrate d'ammonium ferrique - Condalab	10 flacons	NC -

Milieux prêts à l'emploi

Référence	Désignation	Cond.	CHF
693460	Flacon 225 ml bouillon Fraser demi - ClearLine®	6	NC -
994512	Poche 5 litres bouillon Fraser demi - ClearLine®	55	NC -

Gélatine lactose



Pour la confirmation de Clostridium perfringens.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 48 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777256	Milieu déshydraté bouillon gélatine lactose - Condalab	500 g	NC -