Gélose anaérobie

Pour la culture des germes anaérobies notamment Clostridium.

- **Stockage 8 - 15 °C**
- **Incubation à 35 °C ± 2 °C pendant 18 - 48 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777174	Milieu déshydraté gélose anaérobie - Condalab	500 g	NC -

Gélose Baird-Parker

Voir Baird-Parker gélose

Gélose campylobacter

Voir campylobacter

Gélose cétrimide

Voir cétrimide gélose

Gélose chapman

Voir chapman gélose

Gélose chromogénique salmonelle

Voir salmonelle gélose chromogénique

Gélose cœur cervelle

Voir cœur cervelle gélose

Gélose columbia

Voir columbia gélose

Gélose DRBC

Voir DRBC gélose

Gélose DG18

Pour la recherche et la numération des levures et moisissures dans les produits secs dont l'aw est ‹ 0,95.

- **Stockage : 2 - 8 °C à l'obscurité**
- **Incubation : 25 °C pendant 5 jours en atmosphère aérobie et humide**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
693356	Gélose DG18 flacon 100 ml - ClearLine®	10	NC -

Gélose isolation Actinomycète (Actinomycete Isolation agar glycerol)

Pour l'isolation et la culture d'actinomycètes dans le sol et l'eau.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 30°C ± 2°C pendant 72 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777816	Milieu déshydraté gélose isolation Actinomycète - Condalab	500 g	NC -

Gélose différentielle acétate (acetate differential agar)

Pour différencier les Shigelles des Escherichia coli.

- **Stockage 8 - 15 °C**
- **Incubation à 35 °C ± 2 °C pendant 7 jours**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777169	Milieu déshydraté gélose différentielle acétate Condalab	500 g	NC -

Gélose Middlebrook

Voir middlebrook agar

Gélose PCA

Voir PCA

Gélose au sang

Pour la détermination des germes hémolytiques et la confirmation de Bacillus cereus et Listeria monocytogènes.

- **Stockage 8 - 15 °C**
- **Incubation à 35 °C ± 2 °C pendant 18 - 48 h pour Listeria monocytogènes**
- **Incubation à 30 °C pendant 24 h pour Bacillus cereus**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777823	Milieu déshydraté gélose au sang (ISO7932) - Condalab	500 g	NC -

Gélose Wilson Blair

Voir Wilson Blair gélose

Giolotti-Cantoni (bouillon)


Milieu d'enrichissement utilisé pour la recherche de Staphylococcus aureus dans les denrées alimentaires.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 40 - 48 h**
- **Selon ISO 11133 : 37 ± 1 °C pendant 24 ± 2 - 48 ± 2 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777257	Milieu déshydraté bouillon Giolotti - Cantoni - Condalab	500 g	NC -
777258	Milieu déshydraté bouillon Giolotti - Cantoni - ISO 11133 - Condalab	500 g	NC -

Hektoen (gélose)

Milieu sélectif différentiel des bactéries entéropathogènes, particulièrement de Salmonella et de shigella. La composition du milieu permet la différenciation des colonies fermentant rapidement un des 3 sucres (virage du bleu au rouge-saumon) et/ou produisant de l'H_2S (centre noir).



- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 37 ± 1 °C pendant 20 - 24 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777263	Milieu déshydraté gélose Hektoen - Condalab	500 g	NC -

I.T.C. - bouillon Irgasan Ticarcilline et potassium Chlorate

Bouillon pour la sélection et l'enrichissement des Yersinia enterolitica.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 25 ± 1 °C pendant 44 ± 4 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777265	Milieu déshydraté Bouillon I.T.C. - Condalab	500 g	NC -

Supplément

- **A reconstituer dans 8 ml d'eau distillée stérile**
- **Stockage : 2 - 8 °C**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777785	Supplément pour bouillon I.T.C. - Condalab	10 flacons pour 500 ml	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.milian.com