sLB (bouillon)

Pour la croissance bactérienne et conduit à des rendements élevés en plasmide à faible nombre de copies. Utilisé en biologie moléculaire.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 °C ± 2 °C pendant 24 h; 48 et 72 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777502	Milieu déshydraté pour bouillon sLB tamponné - Condalab	500 g	NC -

Letheen (bouillon)

Utilisé dans l'industrie cosmétique pour neutraliser l'action des conservateurs avant examen microbiologique ou pour déterminer l'activité bactéricide des ammoniums quaternaires.

- **Stockage 2 - 8 °C**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
693430	Tube 9 ml Bouillon Letheen - ClearLine®	100	NC -
693411	Tube 10 ml Bouillon Letheen - ClearLine®	100	NC -
693323	Flacon 100 ml Bouillon Letheen - ClearLine®	10	NC -

Letheen modifié (bouillon)

Utilisé pour neutraliser l'action des conservateurs avant examen microbiologique.

- **Stockage : 2 - 25 °C (pour la base déshydratée) et 2 - 8 °C (pour les milieux prêts à l'emploi)**


Milieu déshydraté

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777284	Milieu déshydraté pour bouillon Letheen modifié - Condalab	500 g	NC -

Milieux prêts à l'emploi

Référence	Désignation	Cond.	CHF
693431	Tube 9 ml bouillon Letheen modifié - ClearLine®	100	NC -
693402	Flacon 90 ml bouillon Letheen modifié - ClearLine®	10	NC -
693447	Flacon 200 ml bouillon Letheen modifié - ClearLine®	6	NC -

Levine (gélose)




Escherichia coli

Milieu peu sélectif pour la différenciation des entérobactéries lactose positif et lactose négatif contenues dans les aliments et produits laitiers.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 24 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777285	Milieu déshydraté gélose Levine (E.M.B.) - Condalab	500 g	NC -

Listeria (gélose)



Listeria innocua — Listeria monocytogènes

Milieu pour la détection et la numération des Listeria monocytogènes.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 24 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777289	Milieu déshydraté pour gélose chromogénique Listeria selon Ottaviani et Agosti (ALOA) - Condalab	500 g	NC -

Suppléments

A reconstituer dans 5 ml d'un mélange eau / acétone (1/1). Pour 500 ml de milieu.

- **1 Flacon de substrat de Lipase C**
- **1 Flacon contenant : 50 mg Cycloheximide + 10 mg Ceftazidime + 10 mg Acide Nalidixique + 38350 IU Polymyxin B**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777790	Supplément Lipase C - Condalab	10 flacons pour 500 ml	NC -
777789	Supplément Cycloheximide + sulfate de polymexine B + Ceftazimidime + acide nalidixique - Condalab	10 flacons pour 500 ml	NC -

Lysine fer (gélose)

Permet de différencier Salmonella arizonae par l'étude de la décarboxylation de la lysine.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 48 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777296	Milieu déshydraté gélose lysine fer - Condalab	500 g	NC -

Lysine décarboxylase (bouillon) ISO 10273

Pour l'identification de micro-organismes, spécialement les bacilles entériques, sur la base de leur capacité à décarboxyler la lysine.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 48 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777294	Milieu déshydraté bouillon lysine décarboxylase ISO 10273 - Condalab	500 g	NC -

Lysine décarboxylase (bouillon) ISO 6579

Pour la confirmation biochimique des salmonelles et Yersina enterocolitica.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 37 ± 2 °C pendant 24 ± 3 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777295	Milieu déshydraté bouillon lysine décarboxylase ISO 6579 - Condalab	500 g	NC -

M17 (gélose)

Pour la culture et la numération des streptocoques lactiques dans le lait et les produits laitiers.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 28 - 30 °C pendant 24 - 48 h**

Référence	Désignation	Cond.	CHF
777297	Milieu déshydraté gélose M17 - Condalab	500 g	NC -