MKTTn - Müller Kauffman vert brillant avec novobiocine (Bouillon)

Milieu utilisé pour l'enrichissement sélectif de Salmonella. L'utilisation de ce milieu nécessite l'addition extemporanée d'une solution iodo-iodurée.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : selon ISO 19250 et ISO 11133: 37 °C ± 1 °C pendant 24 ± 3 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777324	Milieu déshydraté pour bouillon MKTTn - Condalab	500 g	NC -

Suppléments

Pour 100 ml de milieu

- **Ajouter extemporanément 20 ml d'une solution d'eau distillée ou déminéralisée contenant 5 g de iodure de potassium et 4 g d'iode. Attention le milieu complet doit-être utilisé le jour même.**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
348454-CER	Iode	100 g	NC -
362405-CER	Iodure de Potassium	250 g	NC -

Moeller KCn (Bouillon)

Pour différencier les bacilles entériques qui ont la capacité à se développer en présence de cyanure.

- **Stockage 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 °C ± 2 °C pendant 24 - 48 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777314	Milieu déshydraté bouillon Moeller KCn - Condalab	500 g	NC -

MIO - Milieu Mobilité Indole Ornithine

Milieu semi-solide pour la différenciation des entérobactéries par la mobilité, l'activité ornithine décarboxylase et la production d'indole.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 °C ± 2 °C pendant 24 - 48 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777313	Milieu déshydraté Mobilité indole ornithine - Condalab	500 g	NC -

Suppléments

- **Pour la détection indole**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777535	Réactif de KOVAC - Condalab	100 ml	NC -
435922-CER	Réactif de KOVAC	100 ml	NC -

Mossel (Bouillon) - EE (Bouillon)

Bouillon d'enrichissement pour Entérobactéries selon Mossel est un milieu sélectif recommandé pour la recherche des Enterobacteriaceae dans les aliments. Conforme Pharmacopée européenne.

- **Stockage : 2 - 30 °C (base déshydratée) 2 - 8 °C (milieu prêt à l'emploi)**
- **Incubation : 37 °C pendant 24 - 48 h**

Base déshydratée


Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777315	Milieu déshydraté bouillon Mossel EE - Condalab	500 g	NC -

Milieux prêts à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
693413	Tube 9 ml bouillon Mossel* - ClearLine®	100	NC -
693371	Flacon 100 ml bouillon Mossel- ClearLine®	10	NC -

* Non conforme à la pharmacopée

Mossel (Bacillus cereus - Gélose)



Bacillus cereus

Recommandée pour la recherche et le dénombrement des spores et des formes végétatives de Bacillus cereus dans les denrées alimentaires.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 °C ± 2 °C pendant 24 - 40 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777183	Milieu déshydraté gélose Bacillus cereus sélective gélose selon Mossel (MYP)- Condalab	500 g	NC -

Suppléments

Pour 900 ml de milieu.

- **Emulsion jaune d'oeuf : 100 ml**
- **Polymixine B* : 100 000 UI**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777780	Flacon 100 ml Emulsion jaune d'oeuf - condalab	1	NC -
777767	Supplément polymixine B* - condalab	10 vials pour 500 ml	NC -

* A reconstituer dans 5 ml d'eau distillée stérile

MRS deMan,Rogosa, Sharpe (Bouillon)

Utilisé pour la culture des lactoBacillus.

- **Stockage : 2 - 25 °C (pour la base déshydratée) et 2 - 8 °C (pour les milieux prêt à l'emploi)**
- **Incubation : 35 °C pendant 3 jours ou 30 °C pendant 5 jours dans une atmosphère enrichie en CO_2**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777317	Milieu déshydraté bouillon MRS - Condalab	500 g	NC -

Milieux prêts à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
693432	Tube 9 ml bouillon MRS - ClearLine®	100	NC -
693344	Flacon 100 ml bouillon MRS - ClearLine®	10	NC -