## MRS deMan,Rogosa, Sharpe (Gélose)

Pour la culture des LactoBacillus. Le milieu à pH 5,4 permet de dénombrer LactoBacillus bulgaricus dans les yaourts.

- **Stockage : 2 - 8 °C (pour la base déshydratée et pour les milieux prêt à l'emploi)**
- **Incubation : 35 °C pendant 3 jours ou 30 °C pendant 5 jours dans une atmosphère enrichie en $CO_2$**

### Base déshydratée

| Réf. | Désignation | Cond. | CHF |
|---|---|---|---|
| 777316 | Milieu déshydraté gélose MRS - Condalab | 500 g | NC - |

### Milieux prêts à l'emploi

| Réf. | Désignation | Cond. | CHF |
|---|---|---|---|
| 693449 | Flacon 200 ml gélose MRS - ClearLine® | 6 | NC - |

## MRS deMan,Rogosa, Sharpe pH 5,7 (Gélose)

Le milieu à pH 5,7 permet le dénombrement des bactéries lactiques mésophiles

- **Stockage : 2 - 8 °C (pour la base déshydratée et pour les milieux prêt à l'emploi)**
- **Incubation : 35 °C pendant 3 jours ou 30 °C pendant 5 jours dans une atmosphère enrichie en $CO_2$**

### Base déshydratée

| Réf. | Désignation | Cond. | CHF |
|---|---|---|---|
| 777858 | Milieu déshydraté gélose MRS bas pH ISO - Condalab | 500 g | NC - |

### Milieu prêt à l'emploi

| Réf. | Désignation | Cond. | CHF |
|---|---|---|---|
| 693372 | Flacon 100 ml gélose MRS pH 5,7 - ClearLine® | 10 | NC - |

## MRVP (Rouge Méthyl - Voges Proskauer) Milieu clarks et Lubs

Pour la différentiation des Escherichia coli des Entobactéries

- **Stockage . 2 - 25 °C**
- **Incubation :**
  **- Pour le test rouge méthyl: 35 ± 2 °C pendant 3 à 5 jours (Tube à incuber avant le test)**
  **- Pour le test Voges Proskauer: 35 ± 2 °C**

| Réf. | Désignation | Cond. | CHF |
|---|---|---|---|
| 777320 | Milieu déshydraté MR-VP de Clark et Lubs - Condalab | 500 g | NC - |

### Réactif nécessaire

- **5 gouttes d'une solution de rouge de méthyl à 0,4% pour le test MR**

| Réf. | Désignation | Cond. | CHF |
|---|---|---|---|
| 339006 | Flacon 2,5 ml alpha naphtol + flacon 2,5 ml potassium hydroxyde pour le test VP | 10 + 10 | NC - |

## MSRV Modified Semisolid Rappaport Vassiliadis (Bouillon)

Bouillon Rappaport Vassiliadis modifié

Pour la détection des espèces salmonelles mobiles selon ISO 6579

- **Stockage . 2 - 25 °C**
- **Incubation : 41,5 °C pendant 24 h**

| Réf. | Désignation | Cond. | CHF |
|---|---|---|---|
| 777319 | Milieu déshydraté milieu MSRV - Condalab | 500 g | NC - |

## Mueller Hinton (Gélose)

Milieu de référence pour les tests de sensibilité des germes aux antibiotiques et sulfamides.

- **Stockage : 2 - 25 °C (pour la base déshydratée) et 2 - 8 °C (pour les milieux prêt à l'emploi)**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 24 h**

### Base déshydratée

| Réf. | Désignation | Cond. | CHF |
|---|---|---|---|
| 777321 | Milieu déshydraté gélose Mueller Hinton - Condalab | 500 g | NC - |

### Milieu prêt à l'emploi

| Réf. | Désignation | Cond. | CHF |
|---|---|---|---|
| 693373 | Flacon 100 ml gélose Mueller Hinton - ClearLine® | 10 | NC - |

## Mueller Kauffman tétrathionate (Bouilon)

Pour l'enrichissement sélectif de salmonelles dans de les aliments.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 42 - 43 °C pendant 6 - 24 h**

| Réf. | Désignation | Cond. | CHF |
|---|---|---|---|
| 777325 | Milieu déshydraté bouillon Mueller Kauffman tétrathionate - Condalab | 500 g | NC - |

### Supplément

- **Ajouter 20 ml/litre d'une solution de iodure et 10 ml/litre de 0,1 % d'une solution vert brillant. Milieu à utiliser le jour même**

## Neutralisant

Le mélange de neutralisant est ajouté au milieu de pré-enrichissement chaque fois que la présence de solution désinfectante est connue ou suspectée. D'une façon générale, ce mélange doit être utilisé à raison de 10 % du volume final du milieu de pré-enrichissement.

- **Stockage 15 - 25 °C à l'obscurité**

| Formule en g/l | | | |
|---|---|---|---|
| **Phosphate disodique** | 100,8 | **L-Histidine HCL** | 1 |
| **Thiosulfate de sodium** | 7,8 | **Tween 80** | 30 |
| **Lécithine** | 3 | **Eau distillée** | 857,4 |

| Réf. | Désignation | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|
| 693422 | Neutralisant ClearLine® - Tube 25 ml | 100 | NC - |

## Neutralisant Universel

Le mélange de neutralisant est ajouté au milieu de pré-enrichissement chaque fois que la présence de solution désinfectante est connue ou suspectée. D'une façon générale, ce mélange doit être utilisé à raison de 10 % du volume final du milieu de pré-enrichissement.

- **Stockage 15 - 25 °C à l'obscurité**

| Formule en g/l | | | |
|---|---|---|---|
| **Phosphate disodique** | 75,45 | **Tween 20** | 20 |
| **Thiosulfate de sodium** | 7,8 | **Tween 80** | 30 |
| **Lécithine** | 3 | **Eau distillée** | 950 |
| **L-Histidine HCL** | 1 | | |

| Réf. | Désignation | Unités/ carton | CHF/ carton |
|---|---|---|---|
| 693329 | Neutralisant universel ClearLine® - Flacon 100 ml | 10 | NC - |