Nitrate mobilité (Gélose)

Milieu pour la confirmation des Clostridium perfringens.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 24 - 48 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777327	Milieu déshydraté milieu nitrate mobilité - Condalab	500 g	NC -

Nocive bactérie pour les brasseries (Bouillon)

Pour la détection des contaminants nocifs en brasserie.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 30 - 35 °C pendant 4 jours**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777863	Milieu déshydraté pour gélose Nocive Brewers bacteria Broth base modified - Condalab	500 g	NC -

Nocive bactérie pour les brasseries (Gélose)

Pour la détection des contaminants nocifs en brasserie.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 30 - 35 °C pendant 4 jours**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777862	Milieu déshydraté pour bouillon Nocive Brewers bacteria Agar base modified - Condalab	500 g	NC -

Nutritif (Bouillon)

Pour la culture de germes non exigeants

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 48 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777332	Milieu déshydraté pour bouillon nutritif - Condalab	500 g	NC -

Gélose nutritive

Milieu pour la culture des germes non exigeants dans l'eau et échantillons clinique.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 35 ± 2 °C pendant 18 - 24 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777328	Milieu déshydraté pour gélose nutritive ISO 6579 / ISO 10273 - Condalab	500 g	NC -

Gélose nutritive avec chlorure de sodium ISO 21258

Milieu recommandé par la norme ISO 21528 pour la confirmation des entérobactéries.

- **Stockage : 2 - 25 °C (Base déshydratée et milieu prêt à l'emploi)**
- **Incubation : 37 ± 1 °C pendant 24 ± 2 h**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777331	Milieu déshydraté pour gélose nutritive avec chlorure de sodium ISO 21258 - Condalab	500 g	NC -

Milieu prêt à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
693374	Flacon 100 ml gélose nutritive avec sodium chlorure - ClearLine®	10	NC -

O.G.A. (Oxytétracycline Glucose Agar - Gélose) (O.G.Y.E.)

Recommandé pour le dénombrement des levures et moisissures dans le lait, les produits laitiers et les aliments.

- **Stockage : 2 - 25 °C (Base déshydratée et milieu prêt à l'emploi)**
- **Incubation : 20 - 25 °C pendant 5 - 7 jourss**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777335	Milieu déshydraté pour gélose O.G.A (O.G.Y.E.) - Condalab	500 g	NC -

Milieu prêt à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
693375	Flacon 100 ml gélose O.G.A. (O.G.Y.E.) - ClearLine®	10	NC -

Supplément

Pour 500 ml de milieu.

- **Ajouter 50 mg d'oxytétracycline dans 5 ml d'eau distillée stérile**

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
777791	Oxytétracycline - Flacon de 50 mg - Condalab	10	NC -

Osmophilique (Gélose)

Pour la recherche des levures osmophilies dans les aliments.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 20 ± 20 °C pendant 48 - 72 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777337	Milieu déshydraté pour gélose osmophilique - Condalab	500 g	NC -

Ox bile bactériologique

Ingrédient utilisé comme un agent inhibiteur sélectif dans des milieux de culture comme le BLBVB

- **Stockage : 2 - 25 °C**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777448	Bile Ox bactériologique - Condalab	500 g	NC -
778405	Bile Ox bactériologique - Condalab	25 kg	NC -