
Pomme de terre sucré (Bouillon)

Bouillon pour la culture des levures et moisissures.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 25 - 30 °C pendant 48 - 72 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777347	Milieu déshydraté gélose bouillon pomme de terre - Condalab	500 g	NC -

Pomme de terre sucré (Gélose)



Aspergillus brasiliensis

Milieu pour la culture et l'identification des levures et moisissures dans les aliments.

- **Stockage : 2 - 25°C pour la base déshydratée et le milieu prêt à l'emploi**
- **Incubation : 30 ± 2°C pendant 18 - 48 h jusqu'à 7 jours si nécessaire (pour culture Trichophyton menragrophytes)**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777346	Milieu déshydraté pomme de terre sucré - Condalab	500 g	NC -

Milieu prêt à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
693377	Flacon 100 ml - pomme de terre sucré - ClearLine®	10	NC -

Pseudomonas (CFC - Gélose)

Pour le dénombrement et l'isolement des Pseudomonas spp dans la viande et les produits à base de viande.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 25 ± 1 °C pendant 44 ± 4 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777350	Milieu déshydraté gélose CFC (base) Pseudomas - Condalab	500 g	NC -

Supplément

A reconstituer dans 5 ml d'eau distillé

Réf.	Désignation	Cond.	CHF/ carton
777773	Supplément C.F.C. (Cétrimide / Fusidate sodium / Céphalothine (sel sodique)) - Condalab	10 flacons pour 500 ml	NC -

Pseudomonas CN (Gélose)

Milieu pour le dénombrement et l'identification des Pseudomonas aeruginosa par membrane de filtration. Milieu recommandé par la norme UNE-EN 12780 et EN ISO 16266.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 36 ± 2 °C pendant 22 ± 2 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777351	Milieu déshydraté gélose Pseudomas CN (UNE-EN 12780:2002) - Condalab	500 g	NC -

R2A (Gélose)

Pour le dénombrement hétérotropique des bactéries dans les eaux potables par la technique de filtration sur membrane ou ensemencement sur gélose.

- **Stockage : 2 - 25 °C pour la base déshydratée et le milieu prêt à l'emploi**
- **Incubation :**
  - **Selon les méthodes standard pour les eaux et les eaux usées : 20 - 28 °C pendant 5 - 7 jours puis 35 °C pendant 5 - 7 jours**
  - **Selon la pharmacopée : 30 - 35 °C pendant au moins 5 jours**
  - **Pour un usage générale : 35 ± 2 °C pendant 24 - 72 h**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777365	Milieu déshydraté gélose R2A - Condalab	500 g	NC -

Milieux prêts à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
693379	Flacon 100 ml - Gélose R2A- ClearLine®	10	NC -

Rappaport Vassilliadis (RV - Bouillon)

Utilisé pour l'enrichissement sélectif de Salmonella dans les denrées alimentaires.

- **Stockage : 2 - 25 °C (pour la base déshydratée) et 2 - 8 °C (pour les milieux prêt à l'emploi)**
- **Incubation : 30 - 35°C pendant 18 - 24 h**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777355	Milieu déshydraté bouillon Rappaport Vassilliadis - Condalab	500 g	NC -

Milieux prêts à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
693414	Tube 10 ml - bouillon Rappaport Vassilliadis - ClearLine®	100	NC -
693380	Flacon 100 ml - bouillon Rappaport Vassilliadis - ClearLine®	10	NC -

Rappaport Vassilliadis Soja (RVS - Bouillon)

Utilisé pour l'enrichissement sélectif des Salmonella dans les denrées alimentaires ou les produits pharmaceutiques.

- **Stockage : 2 - 25 °C (pour la base déshydratée) et 2 - 8 °C (pour les milieux prêt à l'emploi)**
- **Incubation : 41,5 ± 1 °C pendant 24 ± 3 h**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777357	Milieu déshydraté bouillon Rappaport Vassilliadis soja ISO 6579 / ISO 11133 / ISO 19250 - Condalab	500 g	NC -

Milieu prêt à l'emploi

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
693415	Tube 10 ml - bouillon Rappaport Vassilliadis soja - ClearLine®	100	NC -

Ringer

Diluant d'usage général dans l'industrie laitière.

- **Stockage : 20 - 25 °C**

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
693406	Comprimés de Ringer (solution au 1/4) ClearLine®	100	NC -
693348	Solution au 1/4 Ringer ClearLine® - Flacon 90 ml	10	NC -