X.L.D. (Xylose Lysine Désoxycholate Gélose) ISO 6579

Milieu sélectif des entérobactéries et particulièrement de Salmonella et de shigella. Il permet une orientation de l'identification des entérobactéries basée sur 3 critères : fermentation des sucres, décarboxylation de la lysine et production d'H_2S.

- **Stockage : 2 - 25°C**
- **Incubation : 37°C pendant 24 ± 3 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777440	Milieu déshydraté gélose X.L.D. - Condalab	500 g	NC -

X.L.D. (Xylose Lysine Désoxycholate Gélose) Pharmacopée Européenne / USP



Salmonella typhimurium

Milieu sélectif des entérobactéries et particulièrement de Salmonella et de shigella. Il permet une orientation de l'identification des entérobactéries basée sur 3 critères : fermentation des sucres, décarboxylation de la lysine et production d'H_2S. Son utilisation est recommandée par les pharmacopées européenne et américaine.

- **Stockage : 2 - 25 °C (base déshydratée) et 2 - 8 °C à l'abri de la lumière (Milieu prêt à l'emploi)**
- **Incubation : 30 - 35 °C pendant 18 - 48 h**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777441	Milieu déshydraté gélose X.L.D. - Condalab	500 g	NC -

XLT 4 (Gélose)

Améliore significativement le dépistage de Salmonella non-typhi dans des échantillons de poulets et des prélèvements d'environnement de ferme.

- **Stockage : 2 - 25°C (base déshydratée)**
- **Incubation : 30 ± 2°C pendant 18 - 48 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777442	Milieu déshydraté gélose XLT_4 - Condalab	500 g	NC -

Supplément

Pour 1000 ml de milieu.

- **4,60 ml solution de 7-éthyl-2-méthyl-4-undécanol (Tergitol 4®)**

Réf.	Désignation	Unités/ carton	CHF/ carton
777806	Supplément pour Gélose XLT_4	100 ml	NC -

Yeast Extract (Gélose Extrait de levure)

Pour la culture des levures et moisissures, spécialement dans le lait et les produits laitiers.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 28 °C pendant 7 jours**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777444	Milieu déshydraté gélose Yeast extract - Condalab	500 g	NC -


Yeast Mold (Bouillon)

Pour la culture des levures et moisissures.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 30 °C ± 2 °C pendant 18 - 72 heures**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777898	Milieu déshydraté bouillon pour levures et moisissures - Condalab	500 g	NC -

Yersinia (Gélose sélective) ISO 10273



Yersinia enterocolitica

Milieu sélectif pour Yersinia enterocolitica.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 30 °C pendant 24 heures**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777446	Milieu déshydraté pour gélose sélective Yersinia - Condalab	500 g	NC -

Y.G.C. (Yeast Glucose Chloramphénicol - Bouillon)

Pour la sélection et le dénombrement des levures et moisissures dans le lait et les produits laitiers par la méthode du MPN.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 25 - 30 °C pendant 3 - 5 jours**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777260	Milieu déshydraté pour bouillon Yeast glucose chloramphénicol - Condalab	500 g	NC -

Y.G.C. (Yeast Glucose Chloramphénicol - Gélose ou Chloramphénicol glucosé Agar C.G.A.) ISO 6611

Recommandée pour le dénombrement des levures et moisissures dans le lait et les denrées alimentaires.

- **Stockage : 2 - 25 °C (base déshydratée) et 2 - 8 °C (milieu déshydraté)**
- **Incubation : 25 °C pendant 5 jours**

Base déshydratée

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777219	Milieu déshydraté pour gélose Yeast Glucose chloramphénicol - Condalab	500 g	NC -

YPD (Gélose)

Pour le développement des levures dans les procédures de biologie molèculaire, par exemple Saccharomyces cerevisiae.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 25 ± 2 °C pendant 42 - 48 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777514	Milieu déshydraté gélose YPD - Condalab	500 g	NC -

YPD (Bouillon)

Pour le développement des levures dans les procédures de biologie molèculaire, par exemple Saccharomyces cerevisiae.

- **Stockage : 2 - 25 °C**
- **Incubation : 25 ± 2 °C pendant 42 - 48 h**

Réf.	Désignation	Cond.	CHF
777515	Milieu déshydraté bouillon YPD Condalab	500 g	NC -